

## بررسی روابط همبستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و سایر صفات فیزیولوژیک در ارقام برنج

مهر و مجتبایی زمانی<sup>۱</sup>، مسعود اصفهانی<sup>۱</sup>، رحیم هنریزاد<sup>۱</sup> و مهرزاد الله قلی پور<sup>۲</sup>

### چکیده

به منظور تعیین روابط همبستگی بین سرعت و دوره پرشدن دانه با سایر صفات فیزیولوژیک و اجزای عملکرد و پی بردن به آثار مستقیم و غیر مستقیم صفات مختلف بر سرعت پرشدن دانه، تعداد ۹۳ رقم برنج در سال زراعی ۱۳۸۰ در مزرعه مؤسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در یک آزمایش بدون طرح آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. خوشهای مربوط به ساقه‌های اصلی علامت گذاری شده و ۱۰ روز بعد از گرده‌افشانی در فواصل ۳ روزه برداشت شدند. داده‌های وزن خشک دانه در یک مدل چند جمله‌ای درجه ۳ برازش شد (میانگین  $R^2$  برای کلیه ارقام ۰/۹۸)، و به کمک آن سرعت و دوره پرشدن دانه برای همه ارقام ارزیابی گردید. در این بررسی سرعت پرشدن دانه با صفات وابسته به ظرفیت مخزن یعنی وزن دانه، اندازه دانه و تعداد دانه در خوشه همبستگی نشان داد، ولی با صفات وابسته به مبدأ به جزمقدار کلروفیل برگ پرچم و برگ دوم همبستگی معنی داری نداشت. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که وزن نهایی تک دانه، دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم سه صفت سهیم در سرعت پرشدن دانه هستند، ولی نتایج تجزیه علیت مشخص کرد که فقط دو صفت از سه صفت یاد شده (وزن نهایی تک دانه و دوره پرشدن دانه) بیشترین تأثیر را بر سرعت پرشدن دانه دارند. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام بدون در نظر گرفتن وزن نهایی تک دانه نشان داد که مقدار کلروفیل برگ پرچم، عرض دانه، دوره پرشدن دانه و طول دانه در سرعت پرشدن دانه سهیم هستند. چنین به نظر می‌رسد که پس از وزن نهایی دانه که بیشترین اثر مستقیم و مثبت، و دوره پرشدن دانه که بیشترین اثر مستقیم منفی را بر سرعت پرشدن دارند، اندازه دانه نیز بر سرعت پرشدن دانه تأثیر گذارد.

واژه‌های کلیدی: برنج، روند پرشدن دانه، عملکرد، تجزیه علیت

### مقدمه

مردم کره زمین دارد. با توجه به روند سریع افزایش جمعیت، نیاز به افزایش تولید برنج ضروری می‌باشد و ایران به عنوان یکی از کشورهای وارد کننده برنج که واردات سالیانه برنج آن به شمار می‌رود و جایگاه چشمگیری را در خوراک نیمی از

۱. دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استادیار و استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

۲. پژوهشگر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

در اغلب مطالعات، بین سرعت پر شدن دانه و وزن دانه ارتباط معنی داری وجود دارد (۱۶، ۱۳ و ۱۸). جونز و همکاران (۱۳) طی آزمایشی روی ۱۵ رقم برنج مشاهده نمودند که وزن حقیقی خوشه با میانگین و حداقل سرعت پر شدن همبستگی نداشت. در این ارقام در زمینه سرعت پر شدن دانه، اندازه دانه در مقایسه با تعداد دانه اهمیت بیشتری داشت ولی وزن دانه و تعداد دانه با دوره پر شدن دانه همبستگی معنی داری نداشت. کاتو نیز نتایج مشابهی مبنی بر ارتباط مثبت معنی دار بین سرعت پر شدن دانه با وزن دانه و اندازه دانه و ارتباط منفی معنی داری بین سرعت پر شدن دانه با تعداد دانه به دست آورده، وی اظهار داشت که بین سرعت پر شدن دانه با ظرفیت مخزن همبستگی معنی داری وجود دارد ولی بین دوره پر شدن دانه با ظرفیت مخزن همبستگی مشاهده نکرد.

طبق گزارش های موهندس و همکاران، جونز و همکاران، کوماری و والارماتی و کاتو سرعت پر شدن دانه همبستگی مثبت معنی داری با عملکرد دانه دارد، درحالی که دوره پرشدن همبستگی ضعیف تری با عملکرد دارد و بالاترین سرعت پر شدن دانه در مقایسه با دوره پر شدن دانه به بالاترین عملکرد منجر می شود (۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۸). در گیاه برنج، تجمع نشاسته و سایر ترکیبات در دانه وابسته به تولید مواد پرورده توسط برگ های سبز و غلاف است، و فقط مقدار اندکی از مواد پرورده تولید شده قبل از گل دهی بر عملکرد دانه تأثیر دارد. قسمت عمده مواد پرورده تولید شده بعد از گل دهی به طور مستقیم به دانه ها در خوشه انتقال می یابند (۹ و ۱۲). برگ پرچم نقش مهمی در پرشدن دانه ها دارد، زیرا عمدتاً مواد فتوستتری را به خوشه می فرستد. رائو اظهار داشت که قطع برگ پرچم بیشترین اثر را روی عملکرد دارد و چگالی بالای دانه اغلب با جدا شدن برگ پرچم کاهش می یابد (۲۱). وی اظهار کرد که قطع برگ پرچم و ۲ برگ زیرین بر روی عملکرد اثر منفی دارد، در صورتی که قطع برگ چهارم اثر کمی بر عملکرد داشت. وی طی آزمایشی با استفاده از علف کش و

در حدود ۴۰۰-۸۰۰ هزار تن می باشد، در بحران جهانی کمبود برنج درگیر است (۱).

یکی از راه های تولید ارقام پر محصول، پیدا کردن شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر در عملکرد برنج و مدیریت مزرعه در جهت بهبود این شاخص ها می باشد. سرعت و طول دوره پر شدن به عنوان دو صفت فیزیولوژیک مهم، نقش بسزایی در تعیین میزان عملکرد دارند. پر شدن دانه، ذخیره سازی فراورده های پلیمری قندی در سلول ها و اندامک هایی است که در طی دوره بزرگ شدن دانه ایجاد شده اند و به فرایندهای فتوستتر، بارگیری عناصر آبکش، انتقال مواد پرورده، تحلیله آبکش و تبدیل قندها به نشاسته وابسته است (۱۰). پر شدن دانه در طی سه مرحله ۱- رشد کند (۵ روز بعد از گل دهی)-۲- افزایش خطی (۵-۲۰ روز بعد از گل دهی) و ۳- رشد کند ثانویه به اتمام می رسد (۴ و ۵) و زمانی که برنج قهوه ای حداقل وزن خود را به دست آورد مطابق با زمانی است که از لحاظ مورفولوژیکی بزرگ ترین اندازه را پیدا کرده است. وزن دانه وابسته به مقدار انتقال مواد فتوستتری به دانه است که این میزان انتقال وابسته به سرعت و طول دوره انتقال است که به عنوان سرعت و دوره پر شدن دانه شناخته می شوند (۱۲). فرایند پر شدن دانه تابعی از ارتباطات مخزن و منبع می باشد و در واقع نتیجه های از یک توازن بالا بین ۳ ویژگی ۱- تولید مواد فتوستتری توسط مبدأ -۲- انتقال مواد پرورده توسط شبکه انتقالی و ۳- تجمع مواد فتوستتری در مخزن است. ظرفیت مخزن شامل تعداد دانه ها در خوشه و پتانسیل وزن دانه است. مجموع تولید مواد پرورده تابعی از مدت زمان و سرعت تولید مواد پرورده است (۱۳). ظرفیت مخزن بعد از گرده افشاری، عملکرد و تسهیم مواد فتوستتری را تحت تأثیر قرار می دهد. ظرفیت بالای مخزن فتوستتر پوشش گیاهی را افزایش می دهد و در نتیجه مجموع ماده خشک تولید شده بعد از گل دهی بهتر شده و عملکرد دانه بالاتر می رود، زیرا عمدۀ کربوهیدراتهای موجود در دانه حاصل فتوستتر بعد از گل دهی است (۹ و ۱۳).

## مواد و روش‌ها

این آزمایش در فصل زراعی سال ۱۳۸۰ در مزرعه موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت اجرا گردید. از ۹۳ رقم برنج خوش کیفیت ارسال شده از انتیتو بین‌المللی تحقیقات برنج (IRRI) در این طرح استفاده شد. این ارقام در خردادماه در خزانه بذرپاشی شده و در مرحله ۳-۴ برگی در خطوطی به طول ۶ متر به فواصل ۲۰×۲۰ سانتی متر در زمین اصلی به صورت تک بوته نشا شد. پخش کود فسفات (۴ کیلوگرم در ۴۰۰ مترمربع) و افزودن علف‌کش بوتاکلر قبل از نشاکاری در زمین اصلی انجام شد. پخش کود اوره در سه مرحله، قبل از نشاکاری (۴ کیلوگرم در ۴۰۰ مترمربع)، ۲۵ روز بعد از نشاکاری (۲ کیلوگرم در ۴۰۰ مترمربع)، ۴۰ روز بعد از نشاکاری (۲ کیلوگرم در ۴۰۰ مترمربع) و وجین اول و دوم در فواصل ۱۵ و ۲۵ روز بعد از نشاکاری انجام شد.

بعد از مرحله آبستنی (Booting) و خروج اولین خوش‌ها مربوط به ساقه‌های اصلی کلیه بوته‌ها، این خوش‌ها علامت گذاری شدند تا از خوش‌های سایر پنجه‌ها تمایز شوند. ۱۰ روز بعد از گرده‌افشانی خوش‌های علامت گذاری شده، در فاصله زمانی هر سه روز یکبار (در هر نوبت ۳ خوش) برداشت شدند. این عمل تا رسیدگی کامل مزرعه ادامه یافت، به طوری که وقتی مزرعه کاملاً زرد رنگ شد و نوک خوش‌ها کاملاً به سمت پایین خمیده گردید، آخرین برداشت صورت گرفت. خوش‌های بده مدت ۴۸ ساعت در آون در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد و پس از خشکانیدن، وزن خشک شلتونک‌ها تعیین شد. هم‌چنین تعداد دانه در هر خوشه شمارش و ثبت گردید و بدین طریق وزن تک دانه‌ها در هر نوبت برداشت که حاصل میانگین ۳ داده وزن تک دانه در هر نوبت برداشت است، محاسبه شد. از آنجایی که خوش‌ها برای اندازه گیری وزن تک دانه در روزهای ثابتی بعد از برچسب زدن برداشت می‌شدند، زمان دقیق رسیدن به حداقل وزن تک دانه مشخص نبود. به منظور تخمین زمان دقیق رسیدن به حداقل وزن تک دانه، کلیه داده‌های به دست آمده از وزن خشک تک

پوشاندن قسمت‌های مختلف گیاه نشان داد که برگ‌ها به عنوان مهم‌ترین اندام، پرشدن دانه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. طی مطالعات متعدد که توسط آکادمی علوم کشاورزی جیانگ‌شو و مرکز ملی تحقیقات برنج هیرید چین اجرا شده است، بهترین شکل مرفوولوژیک برنج‌های پرمحصول به این صورت که سه برگ بالایی بایستی بلند، راست، باریک ولی ضخیم و نیز مقطع آنها به شکل ۷ باشد، دیده شده است<sup>(۲)</sup>. حفظ کلروفیل در برگ پرچم و در برگ زیری آن باعث تأخیر در پیری برگ و بالا رفتن عمر ماندگاری آن می‌شود که بر انتقال مواد فتوستراتی به دانه در طی دوره پرشدن دانه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد<sup>(۵)</sup>. راهانگ دل و همکاران عملکرد برنج پابلند زودرس را با برنج پاکوتاه دیررس مقایسه کردند<sup>(۱۹)</sup>. ارقام پاکوتاه دیررس با برگ پرچم افزایش، بیشترین سنبلاچه‌های بارور را داشتند و هم‌چنین مقدار کلروفیل در برگ پرچم آنها بیشتر و به دلیل تسهیم مناسب مواد فتوستراتی به دانه‌ها، عملکرد کاه در این ارقام پایین‌تر بود و در کل این ارقام عملکرد بالاتر داشتند. نتایج این آزمایش نشان داد که عملکرد با تعداد خوشه در گیاه، زاویه برگ پرچم و مقدار کلروفیل برگ پرچم همبستگی معنی‌داری دارد.

تعیین بهترین روش اندازه‌گیری پرشدن دانه یک مسئله مهم در زراعت و اصلاح نباتات می‌باشد. روش‌های مختلفی برای حصول تخمینی سرعت و طول دوره پرشدن دانه پیشنهاد شده است. اما به طور کلی برای برآش همه معادلات به اندازه‌گیری‌های متعدد در طول فصل رشد زایشی نیاز است. به منظور تخمین سرعت پرشدن دانه از برآش منحنی‌های لجستیک، سیگموئیدی و چند جمله‌ای درجه ۳ استفاده می‌شود. گاهی نیز فقط با درنظر گرفتن بخش خطی نمودار رشد دانه، به صورت رگرسیون خطی بررسی می‌گردد<sup>(۱۸)</sup>.

هدف از پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی بین سرعت و دوره پرشدن دانه با صفات فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد و شناخت صفاتی است که بیشترین تأثیر را بر فرایند پرشدن دانه دارند.

اندازه‌گیری کلیه صفات ذکر شده بر روی ۵ بوته که به‌طور تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت و میانگین مقدار هر صفت در ۵ بوته برای محاسبات آماری استفاده شد. برای اندازه‌گیری عملکرد دانه در بوته نیز، ۵ بوته برداشت و بعد از خرمن‌کوبی و رسیدن به رطوبت ۱۴ درصد، توزین شد، سپس با میانگین‌گیری عملکرد تک بوته به دست آمد.

به منظور تعیین روابط همبستگی بین صفات مورد ارزیابی با طول دوره و سرعت پر شدن دانه از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS استفاده شد و برای بررسی تأثیر هریک از صفات مورد نظر بر روی متغیر وابسته، هم‌چنین حذف متغیرهایی که اثر ناچیزی روی متغیر وابسته دارند و برآراش بهترین مدل از روش رگرسیون گام به گام توسط نرم‌افزار SPSS، استفاده گردید. به‌منظور کشف روابط علت و معلولی و تعیین اهمیت صفات مؤثر در سرعت پر شدن دانه، تجزیه علیت سرعت پرشدن دانه به اجزاء مربوطه با استفاده از روش دوی و لو<sup>(۶)</sup> به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم انجام پذیرفت (۶). برای انجام این کار از نرم‌افزار Path74 استفاده شد.

## نتایج و بحث

در این پژوهش کلیه داده‌های به دست آمده از وزن خشک تک دانه برای هر رقم در مدل چند جمله‌ایی درجه ۳ برآراش شد که بزرگ‌ترین ضریب تبیین در مدل‌های برآراش شده ۰/۹۹۲ و کوچک‌ترین ضریب تبیین ۰/۹۲۷۱ بود. میانگین ضریب تبیین برای کلیه ارقام ۰/۹۸ بود که نشان می‌دهد در این تحقیق مدل چند جمله‌ایی درجه ۳ (رابطه ۳) مدل مناسبی برای برآراش داده‌های موجود بود.

$$\frac{dy}{dt} = b_1 + 2b_2t + 3b_3t^2 \quad [۳]$$

y وزن تک دانه، t زمان و  $b_i$  ثابت رگرسیونی است.

مقادیر ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه برای ۹۳ رقم برنج در جدول ۱ ارائه شده است. در این تحقیق، سرعت پرشدن دانه با دوره پرشدن همبستگی منفی معنی‌داری در سطح احتمال یک درصد نشان داد. به نظر می‌رسد که در اغلب

دانه برای هر رقم در مدل‌های مختلف برآراش شد و در انتهای از مدل پیشنهادی جونز و همکاران که یک مدل چند جمله‌ایی درجه ۳ بود، به‌دلیل داشتن بالاترین ضریب تبیین‌ها استفاده شد. با استفاده از نرم‌افزار MATLAB از داده‌های وزن تک دانه و زمان برداشت آنها معادله درجه سه‌ای به دست آمد، که با مساوی قراردادن مشتق این معادله با صفر، زمان برای رسیدن به حداقل وزن تک دانه تعیین و در انتهای حداقل وزن تک دانه مشخص شد (۱۳). مدت زمان تا رسیدن به حداقل وزن تک دانه، دوره پر شدن دانه شناخته شد و از حاصل تقسیم حداقل وزن تک دانه بر دوره پر شدن دانه میانگین سرعت پرشدن دانه به دست آمد.

کلیه صفات کمی ارزیابی شده شامل تعداد دانه پر در خوش، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد پنجه بارور در بوته، طول دانه، عرض دانه، زاویه برگ پرچم، مساحت سه برگ بالایی، کلروفیل دو برگ بالایی و وزن مخصوص دو برگ بالایی بر اساس دستور العمل ثبت صفات (SES) (Standard Evaluation System,IRRI) به‌منظور محاسبه مساحت سه برگ بالایی (برگ پرچم، برگ دوم و برگ سوم) در ابتدای مرحله پرشدن دانه (مقارن با دو مراحله برداشت) طول و عرض ۳ برگ مورد نظر مربوط به ساقه اصلی اندازه‌گیری شد و با استفاده از رابطه زیر مساحت آنها محاسبه شد (۲۵).

$$[۱] \quad ۰/۷۲۵ \times \text{عرض برگ} \times \text{طول برگ} = \text{مساحت برگ}$$

وزن مخصوص دو برگ بالایی (SLW) نیز از رابطه ۲ محاسبه شد.

$$[۲] \quad SLW = \frac{\text{وزن خشک ۲ برگ بالایی}}{\text{مساحت ۲ برگ بالایی}}$$

اندازه‌گیری مقدار کلروفیل ۲ برگ بالایی در ابتدای مرحله پرشدن دانه و با استفاده از دستگاه کلروفیل متر دستی SPAD-502 (مینولتای ژاپن) صورت گرفت. قرائت از سه ناحیه مختلف (وسط، نزدیک به نوک و انتهای) در هر برگ ۳۰ مرتبه صورت گرفت و میانگین آن ثبت شد.

## جدول ۱. ضرایب همبستگی بین صفات اندازه‌گیری شده در ۹۳ رقم بونف

بررسی روابط همبستگی سرعت و دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد و ...

	صفت	کلروفیل برگ پرچم	کلروفیل برگ دوم	وزن مخصوص ۲ برگ بالائی	مساحت برگ پرچم	مساحت برگ دوم	مساحت برگ سوم	زاویه برگ پرچم	ارتفاع گیاه	تعداد پنجه بارور	وزن ۱۰۰ دانه	وزن نهایی دانه	سرعت پرشدن دانه	دوره پرشدن دانه	روزها تا ۵۰٪ گلدهی	طول دانه بدون پوسته	عرض دانه بدون پوسته	عملکرد دانه
کلروفیل برگ پرچم	۱	** */\*/۰	** */\*/۰	۱	** */\*/۰	** */\*/۰	** */\*/۰	۱	** */\*/۰	** */\*/۰	۱	** */\*/۰	** */\*/۰	۱	** */\*/۰	** */\*/۰	۱	** */\*/۰
کلروفیل برگ دوم																		
وزن مخصوص ۲ برگ بالائی																		
مساحت برگ پرچم																		
مساحت برگ دوم																		
مساحت برگ سوم																		
زاویه برگ پرچم																		
ارتفاع گیاه																		
تعداد پنجه بارور																		
وزن ۱۰۰ دانه																		
وزن نهایی دانه																		
سرعت پرشدن دانه																		
دوره پرشدن دانه																		
روزها تا ۵۰٪ گلدهی																		
طول دانه بدون پوسته																		
عرض دانه بدون پوسته																		
عملکرد دانه																		

\*، \*\* و HS به ترتیب معنی دار در سطح ۵ درصد، ۱ درصد و غیر معنی دار

در تحقیق نام برد و وجود نداشت (۲۰). در تحقیق حاضر، سرعت و دوره پر شدن دانه با تعداد روز تا ۵۰ درصد گل دهی همبستگی نداشتند. جونز و همکاران نیز عدم وجود چنین همبستگی را در ۱۵ ژنتیپ اعلام نمود (۱۳). بر اساس نتایج کاتو بین سرعت پر شدن دانه با تعداد روز تا ۵۰ درصد گل دهی همبستگی وجود نداشت، ولی بین دوره پر شدن دانه با تعداد روز تا ۵۰ درصد گل دهی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (۱۴).

در بررسی ضرایب همبستگی سرعت پر شدن دانه با صفات وابسته به مبدأ مانند مساحت برگ، وزن مخصوص برگ و زاویه برگ پرچم همبستگی معنی داری مشاهده نشد، ولی بین سرعت پر شدن دانه با میزان کلروفیل برگ پرچم و برگ دوم همبستگی منفی معنی داری در سطح احتمال یک درصد دیده شد. شاید بتوان چنین توجیه کرد که هر چه غلظت کلروفیل برگ بیشتر باشد، عمر ماندگاری برگ بیشتر و مواد پرورده را در مدت زمان طولانی تری به دانه ها می فرستد، بنابراین سرعت پر شدن دانه کنتر و دوره پر شدن دانه طولانی تر می شود. تاکنون اطلاعاتی در این زمینه در تحقیقات دیگر گزارش نشده است.

در این آزمایش عملکرد دانه در بوته با صفاتی مانند تعداد دانه پر در خوش، مساحت ۳ برگ بالایی، ارتفاع گیاه و تعداد پنجه بارور در بوته در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت معنی داری نشان داد، در حالی که با وزن ۱۰۰ دانه همبستگی معنی داری نداشت. چنین به نظر می رسد که ارقام با بیشترین سطح برگ در ۳ برگ بالایی، بالاترین عملکردها را به خود اختصاص داده اند. در واقع برگ ها بر حسب موقعیت خود روی ساقه، مواد فتوستزی را به خوش متنقل می کنند و ۳ برگ بالایی، بخصوص برگ پرچم، بیشترین سهم را در تولید و انتقال مواد فتوستزی به خوش دارند. هر چه سطح برگ بیشتر باشد، میزان جذب نور بیشتر و بنابراین میزان فتوستز برگ افزایش می یابد و در نهایت روی عملکرد تأثیر مثبت می گذارد. علاوه بر آن تعداد دانه پر در خوش و تعداد پنجه بارور از اجزای

ژنتیپ هایی که میانگین سرعت پر شدن بالایی دارند وزن دانه ها در مدت زمان کوتاه تری به حداقل مقدار می رسانند. هم بستگی بین میانگین سرعت پر شدن تک دانه با وزن نهایی تک دانه نیز مثبت و بسیار معنی دار بود و ژنتیپ هایی که دانه های سنگین تری داشتند از سرعت پر شدن بالاتری نیز برخوردار بودند. کاتو همبستگی بین سرعت و دوره پر شدن دانه را منفی ولی غیر معنی دار گزارش کرد و همبستگی بین سرعت و وزن نهایی دانه را مثبت و بسیار معنی دار و همبستگی بین دوره پر شدن دانه و وزن نهایی دانه را غیر معنی دار گزارش نمود (۱۴). نتایج همبستگی های سرعت و دوره پر شدن با وزن نهایی دانه با نتایج جونز و همکاران، کومناری و الارمناتی و موهندس نیز مشابه دارد (۱۳ و ۱۶). سرعت پر شدن دانه در بین ژنتیپ های مورد بررسی با عملکرد همبستگی نشان نداد ولی با اجزای عملکرد از قبیل وزن ۱۰۰ دانه و اندازه دانه در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت و با تعداد دانه پر در خوش در سطح احتمال ۵ درصد همبستگی منفی داشت. در این آزمایش به طور کلی سرعت پر شدن دانه با صفات وابسته به ظرفیت مخزن یعنی وزن دانه، اندازه دانه (طول دانه بدون پوسته، عرض دانه بدون پوسته) و تعداد دانه در خوش همبستگی نشان داد که با نتایج کاتو مبنی بر وجود همبستگی بالا بین سرعت پر شدن دانه با اجزای وابسته به مخزن (وزن دانه، تعداد دانه، اندازه دانه) کاملاً مشابه دارد (۱۴). در واقع توانایی یک مخزن برای کشش مواد فتوستزی به سوی خود بستگی به ظرفیت مخزن دارد و ظرفیت مخزن شامل وزن دانه، تعداد دانه و اندازه دانه می باشد. یک مخزن قوی تر محتويات قند عناصر غربالی را سریع تر تخلیه می کند. در این آزمایش دوره پر شدن دانه با عملکرد و صفات وابسته به ظرفیت مخزن همبستگی معنی داری نشان نداد. رائو و همکاران بین دوره پر شدن دانه با عملکرد همبستگی مشاهده نکردند، ولی به دلیل مواجه شدن با شرایط اقلیمی نامساعد در آخر فصل رشد، سریع تر پر شدن دانه را سودمند دانستند البته شواهدی مبنی بر ارتباط بین دوره پر شدن دانه با ظرفیت مخزن

شکل فضای کمی را اشغال می‌کنند و در واقع کارایی شاخص سطح برگ برای جذب نور بیشتر و بنابراین فتوستز افزایش می‌یابد. ضمناً برگ‌های ضخیم میزان فتوستز بیشتری داشته و به سرعت پیر نمی‌شوند. مدل مورفولوژیک برنج‌های پرمحصول برتر تأیید کننده این نتیجه است، به طوری که وزن خشک سه برگ بالایی در ترکیب 64/E32 Peiai به عنوان یک برنج پرمحصول برتر ۰/۵۵ گرم در ۱۰۰ سانتی‌مترمربع است، در حالی که در واریته‌های پرمحصول معمولی حدود ۰/۴ گرم در ۱۰۰ سانتی‌مترمربع می‌باشد (۲).

در این بررسی بین تعداد دانه پر در خوش به مساحت ۳ برگ بالایی (برگ پرچم، برگ دوم و برگ سوم)، کلروفیل ۲ برگ بالایی و ارتفاع گیاه همبستگی مثبت معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد مشاهده شد. بدین معنی که در اوائل دوره پر شدن دانه هرچه مساحت و غلظت کلروفیل برگ (۳ برگ بالایی) بیشترین نقش را در تولید و انتقال مواد فتوستزی به خوشه دارند (بیشتر باشد، جذب نور بیشتر و میزان تولید مواد فتوستزی برای انتقال به خوشه بیشتر می‌شود، بنابراین تعداد دانه پر در خوشه افزایش می‌یابد. ضمناً تعداد دانه پر در خوشه با تعداد پنجه بارور در سطح احتمال ۱ درصد و با طول دانه و تعداد روز تا ۵۰ درصد گل‌دهی در سطح احتمال ۵ درصد همبستگی منفی داشت. زیرا با افزایش تعداد پنجه بارور رقابت برای جذب نور و عناصر غذایی از محیط افزایش یافته و ضمناً میزان رقابت بین مخازن برای جذب مواد پروردۀ افزایش می‌یابد، بنابراین تعداد دانه پر، اندازه دانه و وزن دانه در هر خوشه کاهش می‌یابد. راثو و چنوبی و سینگ نیز همبستگی مثبتی بین تعداد دانه پر در خوشه با مساحت برگ و ارتفاع گیاه و همبستگی منفی بین تعداد دانه پر در خوشه و تعداد پنجه بارور گزارش کرده‌اند (۴ و ۲۲).

در این تحقیق به منظور برازش کامل‌ترین مدل رگرسیونی بین سرعت پرشدن دانه و سایر صفات رگرسیون گام به گام انجام شد که سرعت پرشدن دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات ارزیابی شده به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند.

عملکرد هستند که در این تحقیق افزایش این دو صفت، افزایش عملکرد را به دنبال داشته است. طبق گزارش راثو همبستگی مثبت معنی‌داری بین عملکرد با سطح برگ پرچم و تعدا دانه پر در خوشه وجود دارد (۲۲). ردی نیز همبستگی مثبت معنی‌داری را بین عملکرد دانه در بوته با تعداد پنجه بارور، طول خوشه و ارتفاع گیاه گزارش کرد (۲۳).

در تحقیق حاضر وزن ۱۰۰ دانه با وزن نهایی دانه در انتهای دوره پرشدن دانه همبستگی مثبت بسیار معنی‌داری داشت. که نشان می‌دهد وزن نهایی دانه به عنوان وزن پیش‌بینی شده (محاسبه شده از طریق مدل رشد دانه) با وزن ۱۰۰ دانه به عنوان وزن حقیقی همبستگی داشته و صحت کاربرد مقادیر پیش‌بینی شده را برای تخمین نتایج مزرعه‌ایی تأیید می‌کند.

ضمناً همبستگی مثبت بسیار معنی‌داری نیز بین وزن ۱۰۰ دانه و اندازه دانه (طول و عرض برنج بدون پوسته) وجود داشت. و ارقام با دانه‌های کشیده و بزرگ‌تر از وزن بالاتری نیز برخوردار بودند. زیرا در واقع اندازه نهایی دانه تحت تأثیر اندازه پوسته (گلوم) می‌باشد و پتانسیل وزن دانه نیز توسط اندازه نهایی دانه و وزن دانه بیشتر است. فوجیتا و همکاران و کاتو همبستگی مثبت معنی‌داری بین وزن ۱۰۰ دانه و اندازه دانه گزارش نموده‌اند که تأیید کننده نتایج این مطالعه است (۷ و ۱۴). در این تحقیق همبستگی منفی بسیار معنی‌داری نیز بین وزن ۱۰۰ دانه و تعداد پنجه بارور دیده شد. بنابراین، می‌توان چنین توجیه کرد که با افزایش تعداد پنجه بارور در واحد سطح رقابت بر سر عوامل محیطی نظیر جذب نور،  $\text{CO}_2$  و ازت بیشتر شده و وزن ۱۰۰ دانه کاهش می‌یابد. ردی نیز همبستگی منفی معنی‌داری را بین وزن ۱۰۰ دانه با تعداد پنجه بارور در بوته گزارش نموده است (۲۳).

در این بررسی وزن ۱۰۰ دانه همبستگی مثبت بسیار معنی‌داری نیز با وزن مخصوص ۲ برگ بالایی نشان داد. به این معنی که هر چه برگ پرچم و برگ زیرین ضخیم و باریک‌تر باشد وزن ۱۰۰ دانه بالا می‌رود. زیرا برگ‌های باریک با مقطع ۷

جدول ۲. نتایج رگرسیون گام به گام سرعت پر شدن دانه با دیگر متغیرهای مورد بررسی در ۹۳ رقم برنج

متغیر وارد شده	$R^2$	b در مرحله وارد شدن	b در مدل نهایی
وزن نهایی تک دانه	۰/۸۷	۳۵/۴۴۲	۳۴/۱۲۳
دوره پرشدن دانه	۰/۹۹	-۰/۰۱۸۰۷	-۰/۰۱۸۱
زاویه برگ پرچم	۰/۹۹	-۰/۰۰۰۰۴	-۰/۰۰۰۰۴
عرض از مبدأ = ۰/۵۳۱			

جدول ۳. خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام سرعت پر شدن دانه با دیگر متغیرهای مورد بررسی با حذف صفت وزن نهایی دانه در ۹۳ رقم برنج

متغیر وارد شده	$R^2$	b در مرحله وارد شدن	b در مدل نهایی
کلروفیل برگ پرچم	۰/۲۱۵	-۰/۰۱۲۶۵	-۰/۰۰۶۳۲۵
عرض دانه بدون پوسته	۰/۳۴۵	۰/۱۸۲	۰/۱۹۰
دوره پرشدن دانه	۰/۴۳۷	-۰/۰۱۸۰۴	-۰/۰۱۹۱۶
طول دانه بدون پوسته	۰/۵۰۴	۰/۰۵۶۶۹	۰/۰۵۶۶۹
عرض از مبدأ = ۰/۵۸۹			

سرعت پر شدن را توجیه کرد. عرض دانه، دوره پرشدن دانه و طول دانه، در مراحل بعدی به مدل افزوده شدند و مجموعاً ۴۵۰ درصد از تغییرات سرعت پر شدن دانه را توجیه کردند. ضریب همبستگی چندگانه  $0/7099$  به دست آمد که یک همبستگی چندگانه نسبتاً قوی را بین متغیرهای موجود در مدل و سرعت پر شدن دانه نشان داد. ملاحظه می‌شود که پس از حذف متغیر وزن نهایی دانه، متغیرهای دیگری نیز وارد مدل رگرسیون شدند که بر سرعت پر شدن دانه موثرند و در مرحله پیش اثر آنها کاملاً روشن نبود. پیش از این کوماری و والراماتی (۱۶) طی آزمایشی به منظور بررسی روابط همبستگی بین سرعت و طول دوره پرشدن دانه با اجزای عملکرد دو رقم برنج، اظهار داشتند که بر طبق نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون، که در آن سرعت پرشدن دانه متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند، صفت وزن نهایی دانه ۸۵ درصد از تغییرات سرعت پرشدن دانه را توجیه کرد و پس از آن به ترتیب صفات تعداد دانه پر در خوش و دوره پرشدن دانه وارد مدل شدند و ۹۹ درصد از

نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در جدول ۲ ارائه شده است. در این بررسی، وزن نهایی دانه به عنوان اولین صفت وارد مدل گردید و به دلیل معنی دار بودن ضریب رگرسیون آن در مدل باقی ماند. اساس انتخاب اولین متغیر مستقل در این روش داشتن بیشترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته می‌باشد. این صفت به تنها ۷۷ درصد از تغییرات سرعت پر شدن را توجیه کرد. پس از آن به ترتیب صفات دوره پر شدن دانه و زاویه برگ پرچم وارد مدل گردیدند و به دلیل معنی دار بودن ضرایب رگرسیون آنها از طریق آزمون t در مدل باقی ماندند، و حدود ۹۹ درصد از تغییرات سرعت پر شدن دانه را توجیه کردند. نتایج نشان می‌دهد که صفت وزن نهایی دانه مقدار زیادی از تغییرات سرعت پر شدن را توجیه می‌کند، که این امر ممکن است اثر متغیرهای دیگر را بپوشاند. بنابراین یکباره دیگر تجزیه رگرسیون گام به گام با حذف صفت وزن نهایی دانه از میان صفات مستقل انجام شد، که نتایج آن در جدول ۳ ارائه شده است. کلروفیل برگ پرچم اولین صفتی بود که وارد مدل شد و ۲۱/۵ درصد از تغییرات

جدول ۴. نتایج رگرسیون گام به گام وزن نهایی تک دانه با دیگر متغیرهای مورد بررسی در ۹۳ رقم برج

b در مدل نهایی	b در مرحله وارد شدن	R <sup>2</sup>	متغیر وارد شده
۰/۰۲۹۲۶	۰/۰۲۴۸	۰/۸۷۸	سرعت پرشدن دانه
۰/۰۰۰۵۲۸	۰/۰۰۰۵۲	۰/۹۹	دوره پرشدن دانه
۰/۰۰۰۰۱۱۵۵	۰/۰۰۰۰۱۱۵۵	۰/۹۹	زاویه برگ پرچم
عرض از مبدأ = -۰/۰۱۵۵			

جدول ۵. اثر مستقیم و غیر مستقیم ۳ متغیر وزن نهایی دانه، دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم بر سرعت پرشدن دانه در ۹۳ رقم برج

متغیر	اثر مستقیم	وزن نهایی دانه	دوره پرشدن دانه	زاویه برگ پرچم	اثر غیر مستقیم از طریق	همبستگی کل با
وزن نهایی دانه	۰/۹۰۳۵	—	۰/۰۳۴۰۳	۰/۰۰۰۴۳	۰/۹۳۸**	۰/۹۳۸**
دوره پرشدن دانه	-۰/۳۴۷۳	-۰/۰۸۸۵۴	—	-۰/۰۰۰۱	-۰/۴۳۶**	-۰/۴۳۶**
زاویه برگ پرچم	-۰/۰۰۴۸	-۰/۰۸۱۳۱	-۰/۰۱۳۸۹	—	—	-۰/۱۰ ns
اثر باقی مانده = ۰/۰۱						

آمده حاکی از ارتباط قوی بین میانگین سرعت پرشدن دانه و وزن نهایی دانه است.

بر پایه نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام به منظور برقراری یک سیستم علت و معلولی تجزیه علیت انجام گرفت. ابتدا متغیر سرعت پرشدن دانه به عنوان متغیر وابسته در برابر متغیرهای وزن نهایی دانه، دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم به عنوان متغیرهای مستقل مورد تجزیه علیت قرار گرفت. نتایج آن در جدول ۵ نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که وزن نهایی دانه دارای بیشترین اثر مستقیم بر سرعت پرشدن دانه می‌باشد. در جدول ۱ نیز مشاهده می‌گردد که این متغیر دارای بیشترین همبستگی مثبت با سرعت پرشدن دانه است و در تجزیه رگرسیون گام به گام نیز نخستین صفتی بود که وارد مدل شد. دوره پرشدن دانه نیز اثر مستقیم منفی بالا بر سرعت پرشدن دانه دارد. کلیه آثار غیر مستقیم در این تجزیه کوچک و قابل اعتماد است. و زاویه برگ پرچم نیز هیچ‌گونه تأثیر مستقیمی بر روی سرعت پرشدن دانه نداشته و همبستگی منفی و ناچیز آن بر سرعت پرشدن دانه ناشی از اثرات غیر مستقیم و

تغییرات سرعت پرشدن دانه را توجیه کردند. طبق گزارش کاتو نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون حاکی از آن است که طول دانه به عنوان اولین صفت وارد مدل رگرسیونی شد و ۸۸ درصد از تغییرات سرعت پرشدن دانه را توجیه کرد. و پس از آن به ترتیب، عرض دانه و تعداد دانه پر در خوشة وارد مدل شدند و حدود ۹۸/۷ درصد از تغییرات سرعت پرشدن دانه را توجیه کردند (۱۴).

در تحقیق حاضر به دلیل این‌که سرعت پرشدن دانه یک عامل محاسباتی از طریق وزن نهایی دانه بود و به منظور رفع هرگونه شکی، مجددًا تجزیه رگرسیون گام به گام انجام و این بار وزن نهایی دانه به عنوان متغیر وابسته و دیگر صفات ارزیابی شده به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. که نتایج آن در جدول ۴ ارائه شده است. در این حالت سرعت پرشدن دانه به عنوان اولین صفت وارد گردید که به تنها ۸۷ درصد از تغییرات وزن نهایی دانه را توجیه کرد. و سپس به ترتیب صفات دوره پرشدن دانه و زاویه برگ پرچم وارد مدل شدند که ۹۹ درصد از تغییرات وزن نهایی دانه را توجیه کردند. نتایج به دست

جدول ۶. اثر مستقیم و غیر مستقیم ۴ متغیر کلروفیل برگ پرچم، عرض دانه، دوره پر شدن دانه و طول دانه بر سرعت پر شدن دانه

متغیر	کلروفیل برگ پرچم	عرض دانه	دوره پر شدن دانه	طول دانه	اثر غیر مستقیم از طریق همبستگی کل با	
					سرعت پر شدن دانه	
کلروفیل برگ پرچم	-۰/۲۳۰	-	-۰/۰۳۸۶	-۰/۱۵۷	-۰/۰۴۲	-۰/۴۷۲**
عرض دانه	۰/۳۸۶	۰/۰۲۳	-	-۰/۰۲۹	۰/۰۳۱	۰/۴۱۴**
دوره پر شدن دانه	-۰/۳۶۹	-۰/۱	۰/۰۲۹	-	۰/۰۰۲	-۰/۴۳۶**
طول دانه	۰/۲۶۸	۰/۰۳۶	۰/۰۴۵	-۰/۰۰۵	-	۰/۳۴۷**
اثر باقی مانده =	۰/۳۱					

از نتایج فوق چنین به نظر می‌رسد که سرعت پر شدن دانه به شدت تحت تأثیر صفات وابسته به ظرفیت مخزن می‌باشد و در ارقامی که اندازه و تعداد دانه بیشتری دارند، میزان تقاضا و بنابراین سرعت انتقال مواد پرورده به سمت مخزن افزایش یافته، بنابراین تجمع مواد پرورده در سلول‌های آندوسپرم سریع‌تر می‌شود، و در واقع سرعت پر شدن دانه تسريع می‌یابد. به طور کلی اگر در روند انتقال مواد فتوستتزی مشکل خاصی وجود نداشته باشد عملکرد واقعی در اثر ظرفیت مخزن و یا کمبود شیره پرورده محدود می‌شود. ون‌کاتسوارلو از طریق کاهش تعداد خوشچه‌های یک رقم برنج دریافت که اگر چه ظرفیت مخزن یک عامل مهم در تعیین عملکرد برنج به شمار می‌آید، اما به نظر می‌رسد که محدودیت منبع نیز از اهمیت بالایی در تعیین عملکرد برنج برخوردار می‌باشد (۲۴). فوکای و همکاران اظهار داشتند که ظرفیت مخزن به تغییر در موجودی مواد پرورده بعد از گردahaشانی حساس است، به طوری که کاهش در موجودی مواد پرورده از زمان گردahaشانی تا ابتدای دوره پرشدن دانه، به ویژه در ارقام پر محصول با تعداد دانه زیاد در خوش، باعث کاهش در درصد دانه‌های پرشده و عملکرد دانه می‌شود (۸).

تاکنون مطالعات زیادی در زمینه روابط سرعت و دوره پر شدن دانه برنج با بسیاری از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و اجزای عملکرد انجام شده است و از آنجایی که در کلیه این مطالعات وزن دانه به عنوان یکی از اجزای مهم تعیین کننده

منفی وزن نهایی دانه و دوره پر شدن دانه بوده است. بار دیگر تجزیه علیت بر پایه نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام انجام گرفت و این بار سرعت پر شدن دانه به عنوان متغیر وابسته در برابر کلروفیل برگ پرچم، عرض دانه، دوره پر شدن دانه و طول دانه مورد تجزیه علیت قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۶ آمده است. در این بررسی عرض دانه دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت روی سرعت پر شدن دانه بود و دوره پر شدن دانه دارای بیشترین اثر مستقیم منفی بود. طول دانه نیز اثر مستقیم مثبتی بر سرعت پر شدن دانه داشت و چنین به نظر می‌رسد که پس از وزن نهایی دانه که بیشترین اثر مستقیم و مثبت را بر سرعت پر شدن دانه دارد، اندازه دانه نیز بر سرعت پر شدن دانه تأثیر گذار باشد. پیش از این جونز و همکاران و کاتو اثر مستقیم اندازه دانه را بر سرعت پرشدن دانه، گزارش کردند (۱۳ و ۱۴). به طوری که با افزایش اندازه دانه، در واقع ظرفیت مخزن افزایش یافته و میزان تقاضا جهت جذب مواد پرورده افزایش می‌یابد. بنابراین دانه‌ها در مدت زمان کوتاه‌تر و با سرعت بیشتری به حداقل وزن خود میرسند. کوماری و والارماتی طی آزمایشی بر ۲ رقم برنج، گزارش کردند که رقم A4-3-1 به عنوان رقم با سنگین‌ترین وزن دانه (۲/۵۰۷ میلی‌گرم/دانه)، بالاترین سرعت پرشدن دانه را به خود اختصاص داده در حالی که رقم C<sub>2-1</sub> با سبک‌ترین وزن دانه (۰/۸۰۰ میلی‌گرم/دانه)، سرعت پرشدن دانه کمتری داشت (۱۶).

شدن دانه از اجزای مهم در رسیدگی دانه‌ها می‌باشند، انتخاب در جهت افزایش سرعت پر شدن دانه‌ها، راهی برای رسیدن به ارقام پر محصول و زودرس می‌باشد، ضمن این‌که برای اینگونه مناطق اصلاح‌گران نبات به دنبال ارقام ایدآلی هستند که وزن دانه بالایی را همراه با طول دوره پر شدن کوتاه داشته باشند.

عملکرد دانه در ارتباط با سرعت و طول دوره پر شدن دانه است، این ارتباط می‌تواند یک راهکار برای بهبود ازدهاری در جهت رسیدن به حداقل عملکرد باشد. از طرف دیگر زودرسی در مناطقی که با تنفس‌های پایان فصل رشد روبه‌رو هستند، بسیار مهم است. اما در اکثر اوقات زودرسی با کاهش عملکرد همراه است. با توجه به این‌که فرایندهای دوره پر

### منابع مورد استفاده

۱. آمارنامه کشاورزی ایران. ۱۳۸۰. انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
۲. درستی، ح. ۱۳۷۹. برنج‌های پر محصول برتر (ترجمه). مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت.
3. Chau, N.M. and S.C. Bhargava. 1993. Physiological basis of higher productivity in rice. Indian J. Plant Physiol. 36: 215-219.
4. Chaubey, P.K. and R.P. Singh. 1994. Genetic variability, correlation and path analysis of yield components of rice. Modras Agric. J. 81: 468-470.
5. Das, S. and A.K. Sarkar. 1981. Effect of post flowering foliar spray of potassium nitrate solution on grain filling and yield of rice and wheat. Indian Agric. 25: 267-273.
6. Dewey, D.R. and K.H. Lu. 1959. A correlation and path coefficient analysis of crested wheatgrass seed production. Agron. J. 51: 515-518.
7. Fujita, K., V.P. Coronel and S. Yoshida. 1984. Grain filling characteristics of rice varieties differing in grain size under controlled environmental conditions. Soil Sci. Plant Nutr. 30: 445-454.
8. Fukai, S., L. Li , P.T. Vizmonte and K.S. Fischer. 1991. Control of grain yield by sink capacity and assimilate supply in various rice cultivars. Exp. Agric. 27: 127-135.
9. Guo, W., C.N. Feng, L.L. Yan, Y.X. Peng , X.K. Zhu and A.G. Zong. 1995. Analysis of the source sink relationship after anthesis in wheat. Acta Agronomica Sinica 21: 334-340.
10. Hoshikawa, K. 1989. The Growing Rice Plant. Akasaka Minato-Ku, Tokyo, Japan.
11. INGER. 1996. Standard evaluation system of rice. IRRI Manila Philippines.
12. Jongkaewwttana, S., S. Geng , J.E. Hill and B.C. Miller. 1993. Within panicle variability of grain filling in rice cultivars with different maturities. J. Agron. Crop Sci. 171: 236-242.
13. Jones, D.B., M.L. Peterson and S. Geng. 1979. Association between grain filling rate and duration and yield components in rice. Crop Sci. 19: 641-644.
14. Kato, T. 1989. Relationship between grain filling process and sink capacity in rice. Japanese J. Breed. 39: 431-438.
15. Kato, T. 1999. Genetic and environmental variations and associations of the characters related to the grain filling process in rice cultivars. Plant Prod. Sci. 2: 32-36.
16. Kumari, S.L. and G. Valarmathi. 1998. Relationship between grain yield, grain filling rate and duration of grain filling in rice. Modras Agric. J. 85: 210-211.
17. Mirza, M.J. 1992. Correlation studies and path analysis of plant height yield components in rice. Sarhad J. Agric. 8: 647-653.
18. Mohandass, D., N. Natarajaratanam and C. Kailasam. 1988. A new hybrid model for panicle growth in rice. J. Agron. Crop Sci. 161: 207-209.
19. Rahangdale, S.L., A.M. Dhopte and S.M. Deshmukh. 1987. Physiological basis of varietal differences in productivity of early tall and late dwarf upland rice. Ann. Plant Physiol. 1: 19-35.
20. Rao, S.P., B. Venkateswarlu and T.L. Acharyulu. 1984. Interrelationships of grain size, number and spikelet filling for enhanced yield potential in rice. Indian J. Plant Physiol. 27: 281-289.
21. Rao, S.P. 1991. Influence of source and sink on the production of high density grain and yield in rice. Indian J. Plant Physiol. 34: 339-348.
22. Rao, S.P. 1992. Flag leaf: a selection criterion for exploiting potential yield in rice. Indian J. Plant Physiol. 35: 265-268.
23. Reddy, C.D. 1992. Studies on correlations and path coefficient in parental lines sensitive to iron chlorosis and F<sub>2</sub>

- populations of rice. *Oryza* 29: 204-207.
24. Venkateswarlu, B. 1976. Source-sink interrelationships in lowland rice. *Plant Soil* 44: 575-586.
25. Yoshida, S. 1984. Rice discusses tipices of rice physiology as they relate productivity. Losbanos philippines.