

## تأثیر برخی عوامل توپوگرافی روی پراکنش نمدار (*Tilia platyphyllos* Scop.) در جنگل واژ مازندران

سید احسان ساداتی<sup>۱</sup>، سید فضل الله عمادیان<sup>۲</sup>، حمید جلیلوند<sup>۳</sup>، جمشید مختاری<sup>۴</sup> و مسعود طبری<sup>۴</sup>

### چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات برخی عوامل توپوگرافی در چگونگی پراکنش درختان نمدار و نحوه زادآوری این گونه در منطقه "واز"، واقع در جنگل‌های چمنستان نور انجام گرفت. پس از تهیه نقشه توپوگرافی و شناسایی منطقه اقدام به نمونه برداری قطعات به صورت انتخابی شد. بر این اساس قطعات نمونه دایره‌ای ۱۰۰۰ متر مربعی مد نظر قرار گرفت طوری که حداقل ۲-۳ اصله درخت نمدار میانسال تا کهن‌سال در آن موجود باشد. مشخصه‌هایی همانند ارتفاع از سطح دریا، شیب منطقه، جهت دامنه، اشکوب جنگل و آمیختگی‌های درختی و زادآوری در این قطعات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که متوسط قطر برابر سینه و ارتفاع درختان نمدار در این رویشگاه به ترتیب ۳۶/۹ سانتی‌متر و ۲۳ متر است. هم‌چنین معلوم شد که نمدار دامنه ارتفاعی ۱۴۰۰-۱۲۰۰ متر، شیب‌های ۷۵-۱۰۰ درصد و جهت‌های شمال شرقی تا شرقی را بیشتر ترجیح می‌دهد و از تراکم بیشتری برخوردار می‌گردد. در این رویشگاه نمدار تشکیل چندین آمیختگی درختی با گونه‌های راش، ممرز و انجیلی می‌دهد که آمیختگی غالب، عمده‌است به صورت نمدار-راش ظاهر می‌شود. در اکثر آمیختگی‌های درختی نمدار در اشکوب بالا قرار می‌گیرد. مشاهدات زادآوری نشان می‌دهد که نمدار اکثرًا از طریق پاجوش تکثیر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نمدار، توپوگرافی، فرم آمیختگی، زادآوری، جنگل‌های خزری

### مقدمه

می‌شود (۱۱). گسترشگاه طبیعی آن از جنوب سوئد تا اسپانیا مرکزی، شمال یونان و جنوب ایتالیا به سمت لهستان و اوکراین گزارش گردیده است (۱۰). در بریتانیا به عنوان یک گونه بومی معرفی شده است که روی خاک‌های راندزین مشتق شده از سنگ آهک یا صخره‌های آتش‌شانی، اغلب با راش اروپایی

گونه *Tilia platyphyllos* Scop. با نام رایج "نمدار" در فارسی و "large - leaved lime" در انگلیسی در مقایسه با گونه هم‌جنس خود در اروپا یعنی *Tilia cordata* Miller یا Small-leaved lime به عنوان یک گونه بیشتر جنوبی تر معرفی

۱. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و در حال حاضر دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

۲. استادیاران جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه مازندران، ساری

۳. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

۴. دانشیار جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

## مواد و روش‌ها


### منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد بررسی، جنگل "نمدار سره" می‌باشد که جزیی از جنگل‌های "واز" (حوضه آبخیز ۴۹ البرز شمالی) در ارتفاعات جنوبی بخش چمستان نور در مازندران مرکزی است. عرض جغرافیایی حوضه از  $۳۵^{\circ} ۱۲' ۰۰''$  تا  $۳۶^{\circ} ۳۰' ۰۰''$  شمالی و طول جغرافیایی آن از  $۵۱^{\circ} ۰۵' ۱۵''$  تا  $۵۲^{\circ} ۰۵' ۱۵''$  شرقی متغیر است (شکل ۱).

### روش تحقیق

جهت اخذ اطلاعات مشخصه‌های رویشگاه نمدار، ابتدا نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ بازدید شد. از آنجایی که نمدار در مناطق خاصی از این جنگل حضور بیشتری داشته است (ارتفاع  $۱۰۰۰$  تا  $۱۶۰۰$  متر از سطح دریا) و عموماً به صورت تک پایه و گروه‌های کوچک و در مواردی بزرگ تر دیده می‌شد تعداد ۳۸ قطعه نمونه دایره‌ای شکل  $۱۰۰۰$  متر مربعی (طوری که در هر قطعه نمونه حداقل ۲-۳ اصله درخت نمدار میانسال تا کهنسال غالب وجود داشته باشد) در جهات جغرافیایی، شیب‌ها و ارتفاعات متفاوت انتخاب شد (جداول ۱، ۲ و ۳) تا تأثیر عوامل توپوگرافی روی فراوانی درختان نمدار تعیین گردد. انتخاب اندازه  $۱۰۰۰$  متر مربع برای قطعات نمونه به دلیل بزرگی تاج درختان نمدار و فواصل زیاد پایه‌های آنها بوده است. استفاده از روش انتخابی (Selective sampling) قطعات برای تعیین ساختار جنگل به دلیل فراوانی کم گونه مورد مطالعه (نمدار) با توجه به تراکم و تنوع آن بوده است (۲). در این تحقیق، فراوانی درختان در هر منطقه و وضعیت ساختمان آنها به لحاظ قرار گرفتن در اشکوب‌ها بررسی شد و بدین ترتیب در هر قطعه نمونه نوع آمیختگی درختی تعیین گردید. برای مطالعه زادآوری مبادرت به انتخاب چهار زیر قطعه (میکروپلات) به مساحت‌های  $۴$  متر مربع در هر پلات شد و کلیه نهال‌های موجود در آنها با توجه به قطر و ارتفاع اندازه‌گیری گردید.

(*Fraxinus excelsior* L.)، زبان گنجشک (*Fagus sylvatica* L.)، افرای شبیه چناری (*Acer pseudoplatanus* L.) و سرخدار (*Taxus baccata* L.) زیست می‌نماید (۱۱). در منطقه آناتولی (شمال ترکیه) پراکنش نمدار در توده‌های جنگلی آمیخته بهن برگ و سوزنی برگ (*Picea abies*) و در قفقاز در ارتفاعات مختلف و تا  $۲۲۰۰$  متر مشاهده می‌شود (۷). نمدار به عنوان یک درخت مزوپیل و سایه پسند در جنگل‌های شمال ایران معمولاً به صورت پایه‌های منفرد در پناه درختان راش و بلوط زیست می‌کند (۱). شایان ذکر است که *T. platyphylllos* در اروپا همانند گونه‌های هم‌جنس خویش در آمریکا به منظور ایجاد فضای سبز، ایجاد سایه در پارک‌ها و خیابان‌ها کاشته می‌شوند. هم‌چنین گل‌های نمدار برای تهیه چای (۶) و به عنوان میزبان زنبور عسل شهرت دارد طوری که عسل رنگ روشن آن در سطح جهان از اشتهر ویژه‌ای برخوردار است (۹). در ارتباط با نمدار مطالعات متعددی در اروپا انتشار یافته است ولیکن تحقیقات روی این درخت در داخل کشور هنوز ناقص است. محققینی چون میرکاظمی (۵) در بررسی خود به فنلوژی این گونه در مناطق شرقی جنگل‌های شمال (لوه) اشاره نموده‌اند. مقدسی (۴) و شیخ الاسلامی و نمیرانیان (۳) به بررسی جنگل شناسی و اکولوژیکی این گونه به ترتیب در جنگل‌های علی‌آباد و نوشهر پرداختند. با این وجود به دلیل پراکنش قابل ملاحظه این گونه از نظر حضور در ارتفاعات و طول‌های جغرافیایی مختلف جنگل‌های شمال، ادامه این بررسی‌ها در برخی حوزه‌های خاص این مناطق همچنان ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق در صدد است تا به بررسی دامنه پراکنش این درخت در ارتباط با عوامل توپوگرافی (جهت، شیب، دامنه و ارتفاع از سطح دریا) در یکی از جنگل‌های تحقیقاتی شمال کشور (واز) پردازد. نتایج این تحقیق می‌تواند در برگیرنده قسمتی از توصیه‌های لازم برای احیای مناسب جنگل‌های مخروبه و نحوه غنی سازی رویشگاه‌های دخالت شده این گونه در شمال کشور باشد.



شکل ۱. نقشه توپوگرافی محل اجرای تحقیق

جدول ۱. توزیع قطعات نمونه در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا (متر)


ارتفاع از سطح دریا (متر)	تعداد قطعه نمونه
۱۵۰۱-۱۶۰۰	۲
۱۴۰۱-۱۵۰۰	۳
۱۳۰۱-۱۴۰۰	۱۳
۱۲۰۱-۱۳۰۰	۹
۱۱۰۱-۱۲۰۰	۶
۱۰۰۰-۱۱۰۰	۵

جدول ۲. توزیع قطعات نمونه در جهات مختلف جغرافیایی


جهات جغرافیایی	تعداد قطعه نمونه
جنوب شرقی	۷
شرقی	۸
شمال شرقی	۱۴
شمال غربی	۵
شمالي	۴

جدول ۳. توزیع قطعات نمونه در طبقات مختلف شیب زمین

شیب دامنه (درصد)	تعداد قطعه نمونه
۷۶-۱۰۰	۲۴
۵۱-۷۵	۱۲
۲۶-۵۰	۲
۰-۲۵	۰



شکل ۲. تعداد درختان نمدادار در طبقات قطری مختلف



شکل ۳. تعداد درختان نمدادار در طبقات ارتفاعی مختلف

سانتی متر) ۳۱ اصله و در بزرگترین طبقه قطری (۱۳۰ سانتی متر) یک اصله می باشد (شکل ۲). متوسط ارتفاع درختان در این رویشگاه ۲۳ متر است. در این رویشگاه، تعداد درختان نمدادار در کوچکترین طبقه ارتفاعی (۵ متر)، یک اصله و در بزرگترین طبقه ارتفاعی (۳۵ متر)، ۱۹ اصله می باشد (شکل ۳).

#### آمیختگی درختان در قطعات نمونه


با عنایت به بررسی قطعات نمونه در عرصه مورد مطالعه، مشخص شد که به طور کلی هفت نوع آمیختگی در قطعات نمونه موجود می باشد (شکل ۴). بیشترین حضور اختصاص به آمیختگی نمدادار راش (۴۰ درصد) و کمترین آن اختصاص به آمیختگی انجیلی - نمدادار (۲/۵ درصد) دارد. جدول ۴ در صد حضور آمیختگی های

مقایسه میانگین فراوانی درختان نمدادار به تفکیک عوامل توپوگرافی (ارتفاع، شب و جهت)، فرم آمیختگی و موقعیت اجتماعی درختان نمدادار و همچنین زادآوری به صورت توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. محاسبات و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel انجام گردید.

#### نتایج

##### تعداد درختان نمدادار در طبقات قطری و ارتفاعی

نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که به طور متوسط تعداد ۹ اصله درخت نمدادار در هر قطعه نمونه موجود است. متوسط قطر برابر سینه درختان نمدادار در این رویشگاه  $36/9$  سانتی متر است. تعداد درختان نمدادار در کوچکترین طبقه قطری (۱۰



شکل ۴. آمیختگی‌های مختلف نمدار در منطقه مورد بررسی

جدول ۴ . فراوانی درصد آمیختگی‌های مختلف درختی نمدار در رویشگاه مورد بررسی

فراوانی(درصد)	آمیختگی درختی
۴۰	نمدار- راش
۱۷/۵	<i>Fagus orientalis</i> - <i>Tilia platyphyllos</i>
۱۷/۵	<i>Tilia platyphyllos</i> – <i>Carpinus betulus</i>
۱۰	<i>Tilia platyphyllos-Carpinus betulus</i>
۷/۵	<i>Carpinus betulus</i> - <i>Tilia platyphyllos</i>
۵	<i>Carpinus betulus</i> – <i>Fagus orientalis</i>
۲/۵	انگلی- نمدار

فراوانی برخوردار می‌باشند. جهت‌های شرقی، جنوب شرقی و شمالی به ترتیب بعد از شمال شرقی قرار دارند و در حالت حد واسط قرار می‌گیرند (شکل ۵).


مختلف درختی را در رویشگاه مورد مطالعه نشان می‌دهد.

فراوانی درختان نمدار به تفکیک عوامل توپوگرافی


#### جهت جغرافیایی

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درختان نمدار در جهت شمال شرقی بیشترین فراوانی و در جهت شمال غربی از کمترین


نتایج حاکی است که بیشترین نسبت فراوانی درختان نمدار (۶۴/۹)



شکل ۶. فراوانی درختان نمدار (در صد)  
در طبقات مختلف شیب دامنه



شکل ۵. فراوانی درختان نمدار (در صد)  
در جهت‌های مختلف جغرافیایی




شکل ۷. فراوانی درختان نمدار (در صد) در طبقات مختلف ارتفاع از سطح دریا

-۱۶۰۰ متر و کمترین آن در طبقات ارتفاعی ۱۳۰۰-۱۴۰۰ متر از سطح دریا قرار دارند. طبقات ارتفاعی کمتر از ۱۳۰۰ متر و تا ۱۰۰۰ متر از این نظر در حالت بیانیں واقع هستند (شکل ۷). این تحقیق ثابت می‌کند که نمدار در این منطقه تا ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا نیز پراکنش دارد اگر چه به صورت گروه‌های کوچک و پراکنده یافت شود.

در دامنه‌های پر شیب (۷۶-۱۰۰ در صد) استقرار یافته است. بر عکس کمترین تعداد (کمتر از ۵/۸ در صد) را می‌توان در شیب‌های ملایم و متوسط (۲۵-۵۰ و ۵۰-۲۶ در صد) مشاهده کرد. دامنه‌های نسبتاً پر شیب (۵۱-۷۵ در صد) با فراوانی ۲۹/۳ در صد، از این لحاظ در حالت بیانیں قرار دارند (شکل ۶).

#### ارتفاع از سطح دریا

فراوانی درختان نمدار با افزایش ارتفاع یعنی از ۱۰۰۰ متر تا ۱۴۰۰ متر از سطح دریا افزایش و سپس تا ۱۶۰۰ متر کاهش می‌یابد. در واقع روند فراوانی در این رویشگاه با حالت زنگوله‌ای ظاهر می‌گردد. به عبارت دیگر می‌توان اظهار داشت که فراوان ترین درختان نمدار (۳۴ در صد) در طبقه ارتفاعی



شکل ۸. فراوانی درختان نمدار (درصد) در اشکوب‌های مختلف

جدول ۵. میانگین در صد فراوانی نهال‌های گونه‌های مختلف در میکرو پلات‌های مورد بررسی

ارتفاع نهال	نمدار راش انگلی	مرز شیردار	گیلاس	بارانک	لور	افرا	ال اوری	سرخدار	ملج	جمع
کوچک‌تر از ۱۳۰ سانتی‌متر	۶۱/۱۵	۰/۰۵	۰/۴	۰/۱	۰/۳	۰/۱	۰/۲	۰/۵	-	۴
بزرگ‌تر از ۱۳۰ سانتی‌متر	۳۸/۸۵	-	۰/۲	۰/۱	۰/۱	۰/۲	-	۰/۰۵	۰/۲	۱
جمع	۱۰۰,۰۰	۰/۰۵	۰/۶	۰/۲	۰/۴	۰/۳	۰/۲	۰/۵۵	۰/۲	۵
									۲/۵	۳۰
										۳۴
										۲۶

### بحث و نتیجه‌گیری

در این تحقیق مشخص شد نمدار در دامنه‌های شمال‌شرقی و شرقی، شیب ۷۵ - ۱۰۰ درصد و ارتفاع ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰ متر از سطح دریا بیشترین حضور را دارد ضمن این‌که بالاترین حد ارتفاعی آن ۱۶۰۰ متر می‌باشد. همانند نتایج مقدسی (۴)، نتایج این تحقیق با سرشت نیمه سایه پسند بودن و تمایل بیشتر به جبهه‌های خنک نمدار کاملاً مطابقت دارد. هم‌چنین با پژوهش صورت گرفته توسط شیخ‌الاسلامی (۳) که نشان می‌دهد این گونه به طور خاص روی دامنه‌های شمالی و شرقی و شمال شرقی گسترش وسیعی دارد هماهنگ است. همانند نتایج این تحقیق در شمال ایران (منطقه واژ)، پژوهش انجام شده توسط یکی از محققین حاکی است که حداقل پراکنش ارتفاعی این گونه در آناطولی ترکیه تا ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا مشاهده می‌شود(۷). تحقیقات دانکن و همکاران (۸) نیز مشخص می‌کند که جنس نمدار حداقل تا ارتفاع ۱۵۰۰ متر از سطح دریا زیست می‌کند. مشاهدات وس (۱۲) نیز آشکار می‌کند که جنس نمدار در منطقه بالا بند و روی شیب‌های متوسط بیشترین گسترش را دارد. این درحالی است که در تحقیق حاضر و در منطقه بالا بند

بزرگ (۱۰ - ۵ آر) به صورت آمیخته با گونه‌های یاد شده و سایر پهنه برگان دیده می‌شوند. بیش از ۹۰ درصد جنگل مورد مطالعه دو آشکوبه و باقی سه آشکوبه و یک آشکوبه هستند. گونه نمدار در اغلب موارد به همراه راش، شیردار و پلت در اشکوب بالا قرار دارد. به طور کلی ۶۵ درصد درختان نمدار دراشکوب اول (بالایی)، ۳۳ درصد در اشکوب دوم (میانی) و ۲ درصد در اشکوب سوم (پایینی) قرار دارند (شکل ۸).

### زادآوری

از مجموع ۱۷۱۷ نهال شمارش شده حدود ۴۵۰ اصله (۲۶ در صد) اختصاص به نمدار دارد. از این تعداد بیش از ۹۰ درصد مبدأ غیر جنسی دارند که از طریق پاجوش به وجود آمدند. راش با ۵۱۵ اصله و انگلی با ۵۰۷ اصله به ترتیب ۳۴ و ۳۰ در صد زادآوری موجود در عرصه را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین مشخص شد حدود ۷۶/۹ در صد نهال‌های نمدار کمتر از ۱۳۰ سانتی‌متر و ۲۳/۱ در صد بیش از ۱۳۰ سانتی‌متر ارتفاع دارند (جدول ۵). تصور می‌شود در برخی موارد قسمت‌هایی از اندام نهال توسط دام آسیب دیده باشد.

(Intimate mixture) را به نمایش می‌گذارد. لازم به ذکر است که در آمیختگی نمدار- راش، در واقع به دلیل شیب دار و سنگلاخی بودن برخی قسمت‌ها، نمدار در مقایسه با راش توانسته است از فراوانی و چیرگی بهتری برخوردار گردد، لذا اطلاق آمیختگی نمدار - راش به این خاطر بوده است. بر عکس در قسمت‌های کم شیب و با خاک عمیق آمیختگی راش - نمدار توانسته است ظهر پیدا نماید. هم‌چنین بررسی وضعیت زادآوری در قطعات نمونه نشان می‌دهد که نمدار در رویشگاه و از همانند رویشگاه‌های مشابه‌اش در مناطق کوهستانی بریتانیا (۱۱) با گونه‌هایی همچون راش، افرای شبه چناری و سرخدار در اختلاط است.

به طور کلی از نتایج این تحقیق می‌توان جمع‌بندی کرد که در منطقه مورد مطالعه نمدار در شیب‌های تند، جهات شمال شرقی و شرقی و ارتفاع ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰ متر از سطح دریا حضور بیشتری پیدا می‌کند اگرچه تا ارتفاعات کمی بالاتر نیز می‌توان استقرار گروه‌هایی از آن را شاهد بود. این درخت اغلب گونه‌های تجاری پهن برگ همانند راش و ممرز را همراهی می‌کند. این مطلب می‌رساند که در احیای جنگل‌های تخریب یافته و یا نیمه تخریب یافته میان بند تا بالا بند رویشگاه واژ و یا لزوماً رویشگاه‌های همچوار می‌توان از کاشت نمدار به همراه گونه‌هایی نظیر راش و یا ممرز و بر حسب ضرورت انگلی استفاده نمود. در این ارتباط، باعنایت به نتایج این تحقیق می‌توان شیب‌های تند و جهات شمال شرقی و شرق را ترجیح داد.

بیشترین فراوانی نمدار در شیب‌های تند مشاهده می‌شود. اختلاف حضور در فراوانی این گونه‌ها را شاید بتوان به متفاوت بودن سرشت آنها نسبت داد.

در این تحقیق مشخص گردید که ۶۵ درصد درختان نمدار در اشکوب بالا و ۳۳ درصد آنها در اشکوب میانی و تنها ۲ درصد در اشکوب پایین قرار دارند. البته گروه‌های مورد مطالعه در این رویشگاه به لحاظ ساختاری دو اشکوبه هستند و نمدار معمولاً در اشکوب بالا قرار گرفته است که این اغلب به علت سن و ابعاد نمدار می‌باشد. مطابق تحقیق به عمل آمده همان‌طور که اشاره گردید بیش از ۹۰ درصد نهال‌های موجود نمدار مبداء غیر جنسی (پاجوش) داشته‌اند. این در واقع با تحقیقات مقدسی (۴) که مشخص نمود در اکثر قطعات نمونه، زادآوری شاخه زاد نمدار بیشتر از دانه زاد آن بوده است همخوانی دارد. البته ناگفته نماند که نهال‌های حاصل به دلیل خوشخوارکی مورد تعییف دام قرار می‌گیرند و جست‌های متعدد حاصل از پاجوش مورد خسارت دام واقع می‌گردند.

به طور کلی در قطعات نمونه مورد بررسی ۷ نوع آمیختگی تشخیص داده شد که حدود ۴۰ درصد از پلات‌ها را نمدار- راش، ۱۷/۵ درصد راش- نمدار، ۱۷/۵ درصد نمدار- ممرز، ۱۰ درصد نمدار- انگلی، ۷/۵ درصد ممرز- نمدار، ۵ درصد ممرز- راش و مابقی را انگلی- نمدار تشکیل می‌دهد. این آشکار می‌کند که نمدار اغلب گونه‌های پهن برگ مهمن جنگل‌های شمال را همراهی می‌کند و با آنها هم‌زیستی راحتی

## منابع مورد استفاده

- ثابتی، ح. ۱۳۷۳. جنگل‌ها، درختان و درختچه‌های ایران. سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، تهران.
- زیبری، م. ۱۳۸۱. زیست سنجی (بیومتری) جنگل. انتشارات دانشگاه تهران.
- شیخ‌الاسلامی، ع. و م. نمیرانیان. ۱۳۸۱. بررسی مشخصه‌های کمی و کیفی نمدار در جنگل‌های (حوزه) غرب مازندران. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ۸(۳): ۷۳-۷۸.
- مقدسی، د. ۱۳۸۰. بررسی مهم‌ترین خصوصیات اکولوژیک نمدار در جنگل‌های علی آباد کتول. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گرگان.
- میر کاظمی، س. ۱۳۷۷. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی فن‌لولوژی گونه نمدار در طرح جنگلداری لوه گرگان. گزارش داخلی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام گلستان.

6. Bremenss, A. 1994. Herbs. Dorling Kindersely, London.
7. Browics, R. 1978. Chorology of trees and shrubs in Southwest Asia. Institute of Denderology, Polish Acadamy of Sci. 1(33):167.
8. Duncan, W., H. Duncan and B. Marion. 1980 Trees of the southeastern United States. Athens: The university of Georgia Press., USA.
9. Haller, J. M. 1995. *Tilia americana*, linden: a neglected jewel. Arbor. Age. 15(7):33-32.
10. Pigott, D. 1988. The ecology and silviculture of limes .Oxford Forestry Institute, Occasional Paper 37: 27-32.
11. Savil, P. S. 1991. The Silviculture of Trees Used in British Forestry. CAB International, Wallingford, UK.
12. Voss, E. G.1985. Michigan flora Saururaceae-Cornaceae). Bloomfield Hills, MI: Cranbrook Institute of Science, Ann. Arbor. Mi. University of Michigan Herbarium, 724p.