

تحمل ژنوتیپ‌های انتخابی پیاز و پلی‌کراس آنها به تریپس پیاز (*Thrips tabaci* Lind.) در اصفهان

سید مظفر منصوری^۱، رحیم عبادی^۱ و مصطفی مبلی^{۲*}

(تاریخ دریافت: ۸۷/۱/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۸۷/۸/۸)

چکیده

تریپس پیاز (*Thrips tabaci* Lind.) یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده رشد پیاز (*Allium cepa* L.) در رسیدن به عملکردهای مطلوب می‌باشد. بنابراین دست‌یابی به ارقام متحمل پیاز به تریپس از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه برای بررسی تراکم جمعیت و میزان آسیب تریپس پیاز از بذور حاصل از خودگشته و پلی‌کراس ۹ ژنوتیپ پیاز انتخابی استفاده شد. برای تهیه بذر به روش پلی‌کراس، غده‌های ۹ ژنوتیپ پیاز، با توجه به پژوهش‌های قبلی در اصفهان انتخاب، و در سال اول به شکل طرح لاتیس متعادل ۹ تیماری کشت گردیدند و اجازه داده شد تلاقی آزاد بین آنها صورت گیرد. پس از برداشت بذرهای پلی‌کراس حاصل از تلاقی‌های آزاد بین ژنوتیپ‌ها و بذور خودگشتن شده ۹ ژنوتیپ اولیه (جمعاً ۱۸ ژنوتیپ)، در سال دوم در دو آزمایش جداگانه (سمپاشی شده و سمپاشی نشده) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۴ تکرار کاشته شدند و عملیات زراعی معمول صورت گرفت. سمپاشی یک هفته در میان در قطعه مربوط به تیمار سمپاشی با استفاده از حشره‌کش دی متوات به میزان ۱ در هزار انجمام شد. از اوایل مرداد تا اواخر مهر ماه هر دو هفته یک بار، نمونه برداری برای اندازه‌گیری تعداد تریپس و میزان آسیب در بوته انجام شد. نتایج نشان داد که در بین ژنوتیپ‌های خودگشتن شده، ژنوتیپ قرمز آذرشهر دارای بیشترین تراکم آفت (۲۲/۲۴) و بالاترین میزان آسیب بود، ولی ژنوتیپ‌های خودگشتن شده سفید قم و سفید ابرکوه دارای کمترین تراکم (به ترتیب ۰/۵۶۸ و ۰/۵۶۸) و حساسیت نسبت به جمعیت تریپس پیاز در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌های مورد آزمایش بودند. بین ژنوتیپ‌های پلی‌کراس شده، ژنوتیپ‌های سفید قم و سفید کاشان کمترین تراکم آفت (به ترتیب ۰/۳ و ۰/۲۴) و میزان آسیب را داشتند و بر عکس ژنوتیپ‌های قرمز آذر شهر و محلی طارم بیشترین تراکم (به ترتیب ۰/۶۶ و ۰/۸۴) و میزان آسیب آفت را دارا بودند. در مجموع عمل پلی‌کراس باعث کاهش معنی‌دار جمعیت تریپس و میزان آسیب تریپس در برابر ژنوتیپ‌های خودگشتن شده گردید.

واژه‌های کلیدی: پلی‌کراس، تریپس پیاز، درصد آسیب، ژنوتیپ

مقدمه

آنها آسیب می‌بینند. میزان آسیب ناشی از آفات پیاز در دنیا ۱۰ تا ۲۵ درصد کل تولید محصول پیاز برآورد گردیده است (۱۱ و ۱۲). از جمله این آفات، تریپس پیاز (*Thrips tabaci* Lind.) است. آسیب تریپس شامل آسیب مستقیم و

علی‌رغم سطح وسیع کشت پیاز، به علت عدم شناخت کافی در مورد مقاومت، حساسیت یا تحمل ارقام پیاز به آفات و عوامل بیماری زا، هرساله مقدار نسبتاً قابل توجهی از محصول توسط

۱. به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استاد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۲. دانشیار علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mobli@cc.iut.ac.ir

که ارقامی مثل Galaxy, Brutus و Masada دارای تحمل نسبتاً بالا، رقم های Bartolo, Super Elite , Supergreen , Protector, Satellite و Rinda دارای قدرت تحمل متوسط و رقم های Hinova و Rinda به آسیب تریپس پیاز حساس بودند (۲۴). به طور معمول، آن کاملاً به آسیب تریپس پیاز حساس بودند (۲۴). به طور معمول، آن دسته از ارقام پیاز که دارای رشد باز بوده و برگ آنها براق می باشد، نسبت به ارقامی که غلاف با برگ های فشرده دارند، آسیب کمتری می بینند. صاف و براق بودن قسمت هوایی گیاه درجه ای از مقاومت را نشان می دهد که احتمالاً مربوط به مواد شیمیایی موجود در لایه مویی برگ است (۲۳). در جمهوری چک کمترین سطح آلودگی در ارقام با برگ های سبز روشن و با لایه مویی دیده شده است، از طرف دیگر در ارقام با غده قرمز آلودگی شدید مشاهده شده است Sweet Spanish (۱۵). به نظر می رسد ارقام سفید پیاز مانند با نسبت به ارقام قرمز در مقابل حمله تریپس مقاوم تر (تحمیل تر) باشند (۱۹). در ایران نیز در سال های اخیر مطالعاتی در خصوص میزان تحمل یا مقاومت نسبی ارقام تجاری پیاز نسبت به تریپس پیاز در سه منطقه کرج، تبریز و اصفهان انجام شده است. توسعه نوری مقدم و همکاران (۱۲) دو رقم سفید کاشان و سفید قم به عنوان ارقام برتر از نظر تحمل به تریپس معرفی شدند. باقی (۱) میزان حساسیت ارقام پیاز متداول در منطقه دزفول را نسبت به تریپس پیاز مورد مطالعه قرار داد. نتایج تحقیقات وی نشان داد که رقم Primavera (TEG) و Texas Early Grano نسبت به دو رقم Mercedes-Benz از حساسیت بیشتری برخوردار است. همتی و بندهیکتوس (۱۳) تعداد ۱۳۱ نمونه جمع آوری شده را از نظر مقاومت به تریپس پیاز در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش نمودند که نمونه هایی که دارای برگ های براق و فاقد لایه مویی اند، به این آفت مقاوم ترند. کلافچی در سال ۱۳۸۱ پس از بررسی روی ۸ رقم پیاز ایرانی و رقم یلوسوئیت اسپانیش نتیجه گرفت که رقم قرمز آذربایجان با میانگین ۲۹/۳ تریپس به ازای هر بوته و ۴۲/۱ درصد آسیب نسبت به سایر ارقام حساس تر بود و رقم سفید قم با میانگین ۵/۶ تریپس به ازای هر بوته و ۱۸ درصد آسیب کمترین حساسیت را نسبت به تریپس پیاز داشت (۸ و ۹) بر این اساس ارقام مختلف پیاز مکانیزم های

غیر مستقیم می باشد. آسیب این حشره روی پیاز و تره فرنگی به صورت نوارها یا لکه های نقره ای روی برگ ها بوده که از به هم پیوستن این نقاط در اثر تخلیه محتويات سلولی، لکه های سفیدی در برگ ها ایجاد می شود (۱۶). همچنین انتهای برگ ها قهوه ای و خشک می شود و گیاه به واسطه بافت آسیب دیده خود آب بیشتری از دست می دهد و نفوذ پاتوژن های گیاهی نیز از این طریق تسهیل می گردد. مدتی بعد، کل گیاه سفید و رنگ پریله شده و برگ ها پژمرده می شوند (۲۱). در آسیب های شدید آفت، ابتدا نوک برگ ها سوخته و خمیده شده و سرانجام بوته از بین می رود. به طور کلی عالیم آسیب آفت شامل پیچیدگی برگ ها، پژمردگی، ضعف، تغییر رنگ در برگ ها و ایجاد لکه های نقره ای زرد و یا قهوه ای روی برگ و در نهایت کوچک ماندن غده پیازو کاهاش محصول است (۳). وجود تنوع ژنتیکی پایه کارهای اصلاحی، گرینش ژنو تیپ ها و نمونه های گیاهی است. دهداری و همکاران ویژگی های زراعی ۱۹ توده بومی پیاز ایرانی و یک رقم خارجی را ارزیابی کردند. نتایج کار آن ها، گویای وجود تنوع بسیار زیاد میان ژنو تیپ ها، از نظر تمام ویژگی های مرفو لژیک و زراعی بود (۵). همچنین مبلی و همکاران در بررسی تولید بذر و اندازه سوخته مادری بر ویژگی های زایشی ۱۳ توده پیاز بومی ایران به این نتیجه رسیدند که ژنو تیپ ها از نظر تمامی ویژگی های اندازه گیری شده در ارتباط با تولید بذر با یکدیگر تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد نشان دادند (۱۰). احتمالاً تنوع ژنتیکی بین ارقام پیاز نسبت به مقاومت ارقام به آفات و بیماری ها نیز وجود دارد. ادلسون و همکاران (۱۸) در تگزاس طی مطالعات مزرعه ای حساسیت ده رقم پیاز را به تریپس بررسی نمودند و نشان دادند که ارقام از این نظر با هم تفاوت دارند به طوری که رقم تگزاس گرانو ۵۰۲ با ۱۶۶/۶ و تگزاس گرانو ۱۰۲۵ وای با ۳۰۸/۷ به ترتیب دارای کمترین و بیشترین تعداد تریپس در هر بوته در پلات های سه پاشی نشده بودند. این محققین از حشره کش نیز برای پایین نگه داشتن میزان هجوم آفت استفاده کردند. شلتون و همکاران طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ بیش از ۳۰۰ واریته کلم پیچ را برای بررسی میزان مقاومت به تریپس پیاز مورد مطالعه قرار دادند. بررسی ها نشان داد

آمده از پژوهش‌های قبلی که حاصل دو نوبت ناجورزدایی بود (۶ و ۸)، و یک ژنوتیپ خارجی در فروردین ماه سال ۱۳۸۱ به صورت نقشه طرح لاتیس متعادل ۹ تیماری در کرت‌هایی به ابعاد ۳×۳ متر با فاصله ۳۵ سانتی متر از یکدیگر کشت شدند. به منظور افزایش تلاقی بین توده‌ها، دانه‌بندی بهتر و بیشتر از یک کنده‌ی زنبور عسل جهت گردە‌افسانی استفاده شد. از تاریخ ۱۰ شهریور تا ۱۵ مهرماه به صورت هفتگی گل‌آذین‌های ارقام مختلف که بذر آنها رسیده بود، از مزرعه برداشت و برای هر ژنوتیپ (بوته) در پاکت‌های مقوایی جداگانه قرار گرفت. زمانی که در هر گل آذین حداقل یک کپسول ترک بر می‌داشت، زمان رسیدن بذر تلقی گردید. سپس این گل‌آذین‌ها همراه ساقه گل دهنده به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از این که بذرها کاملاً رسیدند، برای جدا کردن بذرها، کلیه کپسول‌های مربوط به گل آذین‌های هر بوته از هر ژنوتیپ را از ساقه جدا کرده و سپس بین دو لاستیک آجادار به ملایمت تحت مالش قرار گرفت. در مرحله بعد بوجاری با دست و پس از آن با استفاده از دستگاه دمنده (Blower)، بذر آنها جداسازی گردید. سپس برای هر ژنوتیپ از هر تکرار به مقدار مساوی بذر مخلوط گردید. این بذرها برای کاشت سال بعد در سردهخانه در دمای ۳-۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند.

ب) کاشت بذرهای پلی‌کراس و خودگشن شده

بذرهایی که از دو نوبت خودگشتنی و انتخاب دسته‌جمعی روی توده‌های اولیه به دست آمده بودند همراه بذرهای پلی‌کراس جمعاً ۱۸ ژنوتیپ (هر کدام ۹ ژنوتیپ) کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. کاشت بذر ۱۸ ژنوتیپ در دو قطعه زمین هر یک به مساحت حدود ۶۸۰ مترمربع و به فاصله حدود ۱۰۰ متر از یکدیگر در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در ۴ تکرار در تاریخ ۱۹/۸۲ انجام گردید. هر کرت شامل ۷ ردیف به طول ۳/۵ متر با فاصله ۳۰ سانتی متر از یکدیگر بود. محل آزمایش در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان در منطقه لورک

متفاوتی دارند که می‌توانند جمعیت‌های متفاوتی از آفت تریپس را روی خود جلب و یا دور نمایند. این جمعیت‌ها به مقادیر متفاوتی روی گیاه آسیب وارد می‌نمایند.

در بسیاری از کشورها علاوه بر کاربرد حشره‌کش‌ها و روش‌های مختلف مدیریت کترول آفت از جمله استفاده از ذخایر ژنتیکی و به کارگیری روش‌های مناسب اصلاحی توانسته‌اند راندمان تولید پیاز در واحد سطح را به مقدار نسبتاً زیادی بالا ببرند و تحقیقات عمده‌ای در خصوص سایر جنبه‌های تولید آن، مانند افزایش کیفیت و طعم، قدرت انبارداری و مقاومت به آفات و بیماری‌ها در دست اقدام است (۱، ۲۰ و ۲۵).

روش‌های متعددی برای اصلاح پیاز از جمله انتقال صفت تحمل به آفات و بیماری‌ها از یک رقم متحمل به ارقام حساس وجود دارد لیکن به دلیل وجود گلچه‌های ریز بسیار زیاد، دگر گشن بودن و دوساله بودن گیاه و در دست رس نبودن ارقام نر عقیم، روش پلی‌کراس مناسب و آسان می‌باشد (۷). لذا در این تحقیق از ژنوتیپ‌های مورد نظر بذر به روش پلی‌کراس تهیه کرده و روی انتقال صفات مطلوب از جمله تحمل به تریپس و کاهش میزان آسیب وارد به بوته‌های پیاز بررسی‌هایی انجام شده است.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از ژنوتیپ‌های خودگشن شده انتخابی پیاز شامل هشت ژنوتیپ ایرانی شامل سفید قم، سفید کاشان، قرمز آذرشهر، درچه اصفهان، محلی طارم، قرمز کازرون، محلی کوار، سفید ابرکوه و یک ژنوتیپ خارجی به نام یلوسوئیت اسپانیش و پلی‌کراس آنها استفاده شد. این پژوهش در ۲ مرحله زیر طی مدت دو سال انجام شد.

الف) تهیه بذرهای پلی‌کراس

این عملیات در ایستگاه رزوه متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان، واقع در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان انجام گردید. غده‌های انتخابی هشت ژنوتیپ برتر ایرانی به دست

صورت نقاط نقره‌ای رنگ مشاهده می‌شود، توسط دستگاه Delta-T SCAN image analysis اندازه‌گیری سطح برگ system اندازه‌گیری شد.

تجزیه‌های آماری

داده‌های مربوط به هر کدام از ۲ قطعه سمپاچی شده و سمپاچی نشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس نتایج دو آزمایش در هم ادغام شدند. هم‌چنین در هر تجزیه جداگانه و در تجزیه مرکب داده‌ها، واریانس بین ژنتیک‌ها (۱۷ درجه آزادی) به سه بخش مستقل شامل ژنتیک‌های پلی کراس (۸ درجه آزادی) و مقایسه ژنتیک‌های پلی کراس در برابر ژنتیک‌های خودگشتن شده (۱ درجه آزادی) تفکیک گردید و در تجزیه‌های مرکب نیز اثر متقابل آن‌های سایر عوامل آزمایشی محاسبه شد. آنالیز داده‌ها توسط نرم‌افزار اس. آس (SAS) انجام شد. میانگین‌ها با آزمون LSD مقایسه شدند.

نتایج و بحث

الف) تأثیر رقم و عمل پلی کراس روی تعداد تریپس

نتایج آزمایش نشان داد که بین میانگین تعداد تریپس در هر بوته برای ژنتیک‌های مختلف خودگشتن شده در هر قطعه (سمپاچی یا بدون سمپاچی) و هم‌چنین ژنتیک‌های پلی کراس اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. در مجموع مقایسه میانگین‌های تعداد تریپس در طول دوره نمونه‌برداری برای ۱۸ ژنتیک مورد مطالعه نشان داد که ژنتیک‌های خودگشتن شده سفید قم، پلی کراس سفید قم و پلی کراس سفید کاشان به ترتیب با ۴/۲۴، ۴/۳۰ و ۲/۶۵ عدد تریپس در بوته (بدون تفاوت آماری برای دو میانگین اخیر) در قطعه سم پاشی نشده و ۱/۰۶، ۱/۰۶ و ۱/۴۲ عدد تریپس در بوته (بدون تفاوت آماری برای دو میانگین اخیر) در قطعه سمپاچی شده جزء ژنتیک‌های با تراکم پایین ولی ژنتیک‌های خودگشتن شده و پلی کراس قرمز آذرشهر و پلی کراس محلی طارم به ترتیب با

شهرستان نجف‌آباد بود. این بررسی به صورت دو آزمایش جداگانه (سمپاچی شده و سمپاچی نشده) اجرا گردید. سمپاچی یک هفته در میان در قطعه مربوط به تیمار سمپاچی با استفاده از حشره‌کش دی متوات به میزان ۱ در هزار صورت گرفت.

پس از رشد نسبی بوته‌ها (ابتدا مرحله غده‌دهی) نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری صفات مورد نظر از تاریخ ۱۲ مردادماه آغاز و هر ۲ هفته یک بار تا یک هفته قبل از برداشت (۸۲/۷/۲۱) صورت گرفت. برای این منظور از هر کرت ۵ بوته نمونه از ردیف دوم و ششم کرت گرفته شد. برای انتقال نمونه‌ها از مزرعه به آزمایشگاه از کیسه‌های نایلونی استفاده شد. در آزمایشگاه نمونه‌ها بررسی و یادداشت‌برداری لازم صورت گرفت و در هر نوبت، میانگین ۵ بوته نمونه‌برداری شده در مورد هر صفت محاسبه و به عنوان داده‌های آزمایشی برای تجزیه‌های آماری مورد استفاده قرار گرفت.

۱. تعداد تریپس روی کل بوته

در هر بوته، همه برگ‌ها پس از جدا شدن از محل غلاف، زیر بینوکولار مشاهده و لاروها و حشرات کامل تریپس مورد شمارش قرار گرفتند و تعداد آنها در جداول مربوطه ثبت شد. هم‌زمان با شمارش، نمونه‌هایی از لاروها و حشرات کامل تریپس موجود در روی بوته‌ها با قلم موی «۰۰۰» به آرامی برداشته و در الکل ۷۵ درصد نگهداری شدند. هم‌چنین کلیه تریپس‌های احتمالی که در کیسه‌های نایلونی باقی‌مانده بودند، شمارش شدند. در ضمن نمونه‌های تریپس مورد بررسی در این پژوهش توسط آقای مهندس خیراندیش، تریپس پیاز با نام علمی *Thrips tabaci* Lind. تشخیص و تأیید گردیدند.

۲. اندازه‌گیری سطح آسیب واردہ توسط تریپس

بدین منظور برگ پنجم از پایین هر بوته از محل غلاف به‌وسیله تیزبر قطع شد. سپس قطعه‌ای از برگ به طول سه سانتی‌متر و به فاصله سه سانتی‌متری از محل اتصال پهنک برگ به غلاف انتخاب و جدا گردید و با ایجاد یک شکاف طولی به صورت مسطح درآمد (۹). سپس میزان آسیب واردہ به این قطعات که به

کمتری می‌بینند (۱۷). در این بررسی نیز ژنوتیپ قرمز آذرشهر از نظر ظاهری دارای برگ‌هایی تیره رنگ بوده ولی سفید قم دارای برگ‌های روشن و شفاف است. در خصوص علت تفاوت در تعداد تریپس روی ژنوتیپ‌های خودگشن شده و پلی‌کراس، علاوه بر تفاوت‌های ژنتیکی و فنوتیپی ذاتی، قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی گیاه نیز اهمیت دارد. بدان مفهوم که در هر ژنوتیپ پلی‌کراسی که تراکم پایین‌تری از تریپس نسبت به ژنوتیپ خودگشن شده خود نشان داد، ترکیب مناسبی از ژن‌های کنترل کننده آفت به آن ژنوتیپ وارد شده است.

ب) اثر سمپاشی و اثر متقابل آن با ژنوتیپ روی تعداد تریپس

اثر سمپاشی و نیز اثر متقابل سمپاشی و ژنوتیپ بر تعداد تریپس در هر بوته، از نظر آماری در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. در حالی که در این دوره در مجموع، سمپاشی باعث کاهش تعداد تریپس در بوته گردید و از ۱۰/۰۲ عدد تریپس در بوته در قطعه سمپاشی شده رسید، اما تراکم تریپس باقی تریپس در قطعه سمپاشی شده رسید، اما تراکم تریپس باقی مانده پس از انجام سمپاشی روی ژنوتیپ‌ها متفاوت بود (جدول ۱). برای مثال در ژنوتیپ خودگشن شده سفید قم سمپاشی تأثیر کمی در کاهش جمعیت آفت داشت، ولی این تأثیر برای سایر ژنوتیپ‌ها بیشتر بود (جدول ۱). در مطالعات کلafچی (۸ و ۹) و هم‌چنین ونکاتش و دیوید (۲۵) نیز سمپاشی با حشره‌کش پروفنوفوس (امولسیون ۴۰ درصد) باعث کاهش معنی دار میانگین تعداد تریپس در بوته شد و اثر متقابل سمپاشی و رقم بر تعداد تریپس معنی دار بود. به عبارت دیگر واکنش حشرات موجود روی ارقام مختلف نسبت به سم متفاوت بود. به طوری که کاهش میانگین تعداد تریپس در اثر سمپاشی روی رقم سفید قم خیلی کم ولی در مورد رقم قرمز آذر شهر بسیار شدید بود.

۲۲/۲۴، ۲۰/۶۶ و ۱۹/۸۴ عدد تریپس در بوته در قطعه بدون سم پاشی و خودگشن شده قرمز آذرشهر و محلی طارم به ترتیب با میانگین تراکم ۶/۵۴ عدد و ۷/۲۴ عدد تریپس در بوته در قطعه سمپاشی شده دارای تراکم بالایی از تریپس بین کلیه ژنوتیپ‌ها بودند (جدول ۱). نتایج به دست آمده در مورد ژنوتیپ‌های خودگشن شده، با نتایج تحقیقات کلafچی مطابقت دارد (۸). نتایج وی نشان داد که میانگین تعداد تریپس در هر بوته به ترتیب در رقم قرمز آذرشهر و سفید قم دارای بیشترین و کمترین است. مرتضوی بیک و همکاران (۱۱) نیز گزارش کردند که در بین ۱۱ ژنوتیپ، سفید قم و بعد از آن سفید کاشان کمترین تعداد تریپس را داشته‌اند. هم چنین یوسفی و عباسی‌فر (۱۴) نیز در بررسی‌های سه ساله روی ارقام پیاز رایج در ایران به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین میزان تراکم تریپس را در ارقام قرمز آذرشهر و سفید قم گزارش نمودند. در مجموع عمل پلی‌کراس باعث کاهش تعداد تریپس در بوته گردید (جدول ۱). ژنوتیپ‌های پلی‌کراس سفید کاشان، قرمز آذرشهر، قرمز کازرون نسبت به خودگشن شده این ارقام از نظر میانگین تعداد تریپس کاهش نشان دادند. ولی بر عکس در مورد ژنوتیپ محلی طارم نه تنها کاهش معنی داری در میانگین تعداد تریپس در پلی‌کراس نسبت به خودگشن شده آن مشاهده نگردید بلکه افزایش معنی دار ملاحظه شد. در بقیه ژنوتیپ‌ها تفاوت معنی داری بین خودگشن شده و پلی‌کراس مشاهده نشد (جدول ۱). از دلایل احتمالی برای تفاوت جمعیت تریپس روی ژنوتیپ‌های مختلف علاوه بر تفاوت‌های خصوصیات ژنتیکی و بیوشیمیایی که در نتایج تعدادی از مطالعات بیان شده است (۴، ۸، ۱۱، ۱۵ و ۱۷)، می‌توان به خصوصیات مرفوژیکی مانند رنگ برگ، میزان برآق بودن برگ (لایه موئی)، فواصل بین برگ‌ها و هم‌چنین وجود مواد شیمیایی دفاعی در گیاه اشاره کرد. زیرا خصوصیات مرفوژیک گیاه به ویژه برگ‌ها با حاشیه پهن یا گرد و گیاهان با ساختمان باز، از دلایل تراکم‌های کم تریپس روی برخی واریته‌های پیاز بوده‌اند (۲ و ۱۷). معمولاً ژنوتیپ‌های با رشد باز و برگ‌های برآق نسبت به ژنوتیپ با برگ‌های فشرده، آسیب

جدول ۱. مقایسه میانگین‌های تعداد تریپس در بوته در ژنوتیپ‌های خودگشتن شده و پلی‌کراس پیاز
در تیمارهای سمپاشی نشده و سمپاشی شده*

میانگین +	تفاوت	میانگین تعداد تریپس ++		ژنوتیپ‌ها	سمپاشی
		پلی‌کراس	خودگشتن شده *		
۱۰/۰۲ ^a	-۱/۶۵	۴/۳۰ ^c	۲/۶۵ ^e	سفید قم	سمپاشی نشده
	۵/۵۲*	۴/۲۴ ^c	۹/۷۶ ^c	سفید کاشان	
	۱/۵۸	۲۰/۶۶ ^a	۲۲/۲۴ ^a	قرمز آذرشهر	
	۰/۵۷	۷/۷۰ ^b	۸/۲۷ ^{cd}	درچه اصفهان	
	-۴/۲۴*	۱۹/۸۴ ^a	۱۵/۶۰ ^b	محلی طارم	
	۶/۵۳*	۷/۵۷ ^b	۱۴/۱۰ ^b	قرمز کازرون	
	۲/۷۱	۷/۴۸ ^b	۱۰/۱۹ ^c	محلی کوار	
	-۰/۰۷	۵/۷۵ ^b	۵/۶۸ ^d	سفید ابرکوه	
	-۱/۸۲	۸/۰۸ ^b	۶/۲۶ ^d	یلو سوییت اسپانیش	
	-۰/۳۲	۱/۳۸ ^d	۱/۰۶ ^f	سفید قم	
۳/۰۱ ^b	۲/۲۵*	۱/۴۲ ^d	۳/۶۷ ^c	سفید کاشان	سمپاشی شده
	۱/۸۴*	۴/۷۰ ^b	۶/۵۴ ^a	قرمز آذرشهر	
	-۰/۰۵	۲/۶۲ ^c	۲/۵۷ ^{cd}	درچه اصفهان	
	-۱/۸۱*	۷/۲۴ ^a	۵/۴۳ ^b	محلی طارم	
	۰/۷۵	۲/۱۷ ^{cd}	۲/۹۲ ^{cd}	قرمز کازرون	
	۰/۱	۲/۰۵ ^{cd}	۲/۱۵ ^{d-f}	محلی کوار	
	۰/۳	۱/۹۷ ^{cd}	۲/۲۷ ^{de}	سفید ابرکوه	
	-۰/۳	۲/۰۵ ^{cd}	۱/۷۵ ^{ef}	یلو سوییت اسپانیش	
		۶/۱۸ ^b	۶/۸۴ ^a	میانگین	

*: توده‌هایی که در دو نسل غده‌ها ناجورزدایی شده و گل‌ها خودگشتن شده‌اند.

++: میانگین‌های موجود در هر ستون (خودگشتن شده یا پلی‌کراس) و در هر قطعه (سمپاشی یا بدون سمپاشی) که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد ندارند.

+: حداقل تفاوت معنی‌دار برای دو میانگین سمپاشی شده و سمپاشی نشده در سطح احتمال ۵ درصد برابر است با $LSD = ۰/۸۵$

*: نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد بین ژنوتیپ خودگشتن شده و پلی‌کراس هر رقم می‌باشد.

**: حداقل تفاوت معنی‌دار برای دو میانگین خودگشتن شده یا پلی‌کراس هر رقم بین قطعه سمپاشی نشده و سمپاشی شده برابر است با $LSD = ۰/۰۶$

نشان دادند. در مجموع پس از مقایسه میانگین‌های میزان آسیب واردہ در طول این دوره نمونه‌برداری (۸۲/۵/۱۲ تا ۸۲/۷/۲۱) برای ژنوتیپ‌های مورد مطالعه به ترتیب ژنوتیپ‌های خودگشتن

ج) تأثیر رقم و عمل پلی‌کراس روی درصد آسیب

ژنوتیپ‌های مختلف مورد مطالعه از نظر میانگین میزان آسیب واردہ به هر بوته در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی‌داری

ارقام مختلف مورد آزمایش این پژوهش روی گل‌های ماده والدهای مختلف پراکنده شده اند و هر ژنتیپ پلی‌کراس حاصل تلفیقی از دانه‌های گرده مختلف و گل‌های ماده گیاه پایه است. به عبارت دیگر میزان ترکیب پذیری عمومی (GCA) در ژنتیپ‌های پلی‌کراس متفاوت بوده است. به طوری که در برخی ژنتیپ‌های پلی‌کراسی که تراکم تریپس نسبت به ژنتیپ خودگشن شده آنها کمتر شده، ترکیب مطلوبی از ژن‌های کنترل کننده تریپس و یا ژن‌هایی که میزان جذابیت ژنتیپ مربوطه را به آفت کاهش داده است، به آن ژنتیپ پلی‌کراس وارد شده و در ژنتیپ‌های پلی‌کراسی که حساسیت یا جذابیت بیشتری را به تریپس در مقایسه با ژنتیپ خودگشن شده خود نشان دادند می‌توان به ترکیب نا مناسب ژنتیکی در آنها اشاره کرد.

د) اثر سمپاشی و اثر متقابل آن با ژنتیپ روی میزان آسیب واردہ توسط تریپس

اثر سمپاشی و اثر متقابل سمپاشی و ژنتیپ بر میزان آسیب واردہ توسط تریپس، از نظر آماری در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. این اثرات در مورد تعداد تریپس در بوته نیز معنی دار بود (جدول ۱). در کل سمپاشی میانگین آسیب واردہ به بوته‌ها را از ۳۴/۸۱ درصد در قطعه سمپاشی شده به ۲۲/۰۵ درصد در قطعه سمپاشی شده کاهش داد (جدول ۲). اما واکنش ژنتیپ‌ها متفاوت بود و سمپاشی به نسبت‌های مختلفی باعث کاهش آسیب در ژنتیپ‌ها گردید. مثلاً در مورد ژنتیپ‌های خودگشن شده و پلی‌کراس سفید قم و ژنتیپ پلی‌کراس سفید کاشان سمپاشی درصد آسیب را تقریباً "به نصف" رسانید. اما این اثر در سایر ژنتیپ‌ها کمتر بود (جدول ۲).

با توجه به جداول ۱ و ۲، هم چنین نتایج حاصله از اثر متقابل ژنتیپ د ر برابر سمپاشی چنین استنباط می‌شود که تأثیر سم در کاهش تعداد آفت و میزان آسیب روی ژنتیپ‌های مختلف، با نسبت‌های متفاوتی است.

لازم به ذکر است که استفاده از روش پلی‌کراس جهت

شده و پلی‌کراس قرمز آذرشهر در قطعه بدون سمپاشی با میانگین ۴۴/۶۸ و ۴۱/۲۸ درصد و در قطعه سمپاشی شده با میانگین ۲۸/۱ و ۲۶/۵۶ درصد بیشترین و ژنتیپ‌های خودگشن شده و پلی‌کراس سفید قم به ترتیب با ۲۱/۲۳ و ۲۶/۷۲ در قطعه بدون سمپاشی و ژنتیپ خودگشن شده سفید قم و پلی‌کراس سفید کاشان در قطعه سمپاشی شده به ترتیب با ۱۱/۸۵ و ۱۰/۳۵ درصد کمترین میزان آسیب واردہ به هر بوته را نشان دادند (جدول ۲). این نتایج نشان می‌دهند که بین میانگین تعداد تریپس موجود روی این ژنتیپ‌ها و میزان آسیب وارد شده به این ژنتیپ‌ها در اثر فعالیت تغذیه ای آفت رابطه مستقیمی وجود دارد، زیرا ژنتیپ خودگشن شده قرمز آذرشهر بالاترین تعداد تریپس و ژنتیپ خودگشن شده سفید قم پایین ترین تعداد تریپس را داشتند (جدول ۱). در قطعه بدون سمپاشی در ژنتیپ‌های پلی‌کراس سفید کاشان، قرمز آذرشهر و قرمز کازرون در مقایسه با ژنتیپ خودگشن شده آنها کاهش معنی‌داری از نظر میزان آسیب واردہ توسط تریپس پیاز مشاهده شد (جدول ۲) که این تفاوت معنی‌دار در مورد میانگین تراکم تریپس در ژنتیپ‌های پلی‌کراس سفید کاشان و قرمز کازرون نیز قابل مشاهده است (جدول ۱). اما این مطلب در مورد ژنتیپ سفید قم و سفید ابر کوه کاملاً بر عکس بود. یعنی این که ژنتیپ‌های پلی‌کراس آنها نسبت به خودگشن شده خود افزایش معنی‌داری از نظر درصد آسیب واردہ نشان دادند. سه ژنتیپ پلی‌کراس درجه، محلی کوار و یلوسویت اسپانیش تفاوت معنی‌داری از این نظر با ژنتیپ خودگشن شده خود نشان ندادند. ژنتیپ پلی‌کراس محلی طارم تنها ژنتیپی است که با وجود تراکم بالاتر تریپس در پلی‌کراس نسبت به خودگشن شده خود (جدول ۱)، آسیب کمتری را در ژنتیپ پلی‌کراس نشان داد. علاوه بر تفاوت‌های ژنتیکی و ظاهری هر ژنتیپ می‌توان به انتقال ژن‌های حاوی صفات متنوع بین ژنتیپ‌های مختلف در هنگام تهیه ژنتیپ پلی‌کراس به عنوان دلیل دیگر برای وجود اختلافات بین ژنتیپ‌های مورد آزمایش اشاره نمود. بدین صورت که با عمل گردهافشانی، دانه‌های گرده

جدول ۲. مقایسه میانگین‌های میزان آسیب واردہ به هر بوته در ژنتیپ‌های خودگشن شده و پلی‌کراس پیاز
در تیمارهای سمپاشی نشده و سمپاشی شده **

میانگین +	تفاوت	میانگین درصد آسیب ++		ژنتیپ‌ها	سمپاشی
		پلی‌کراس	خودگشن شده		
$\bar{x}_{\text{M}} = 5/50^*$	-5/50*	26/72 ^f	21/23 ^f	سفید قم	سمپاشی نشده
	10/73*	23/62 ^g	34/35 ^{cd}	سفید کاشان	
	3/40*	41/28 ^a	44/68 ^a	قرمز آذرشهر	
	1/87	38/67 ^{ab}	40/54 ^b	درچه اصفهان	
	2/51	36/67 ^{bc}	39/18 ^{bc}	محلی طارم	
	9/10*	31/58 ^c	40/68 ^b	قرمز کازرون	
	0/18	36/17 ^{b-d}	36/35 ^{cd}	محلی کوار	
	-3/76*	33/65 ^{de}	29/89 ^c	سفید ابرکوه	
	1/16	34/82 ^{cd}	35/98 ^d	یلو سویت اسپانیش	
$\bar{x}_{\text{M}} = 22/50^b$	-3/51*	12/86 ^d	10/35 ^f	سفید قم	سمپاشی شده
	7/46*	11/85 ^e	19/31 ^c	سفید کاشان	
	1/54	26/56 ^a	28/10 ^a	قرمز آذرشهر	
	1/01	24/82 ^{ab}	25/83 ^b	درچه اصفهان	
	5/21*	22/94 ^c	28/15 ^a	محلی طارم	
	3/93*	22/71 ^c	26/64 ^{ab}	قرمز کازرون	
	-1/28	22/44 ^c	21/18 ^d	محلی کوار	
	-2/75*	23/07 ^{bc}	20/37 ^{de}	سفید ابرکوه	
	-0/14	24/21 ^{bc}	24/07 ^c	یلو سویت اسپانیش	
$\bar{x}_{\text{M}} = 27/56^b$		$\bar{x}_{\text{M}} = 29/30^a$		میانگین	

++: میانگین‌های موجود در هر ستون (خودگشن شده یا پلی‌کراس) در هر قطعه (سمپاشی یا بدون سمپاشی) که حداقل دارای یک حرف مشترک باشند از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد ندارند.

+: حداقل تفاوت معنی‌دار برای دو میانگین سمپاشی شده و سمپاشی نشده در سطح احتمال ۵ درصد برابر است با $LSD_{5\%} = 0/57$.

*: نشان دهنده اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد بین ژنتیپ خودگشن شده و پلی‌کراس هر رقم می‌باشد.

**: حداقل تفاوت معنی‌دار برای دو میانگین خودگشن شده یا پلی‌کراس هر رقم بین قطعه سمپاشی نشده و سمپاشی شده برابر است با $LSD_{5\%} = 2/44$.

وارده نسبت به ژنتیپ‌های خودگشن شده کاهش نشان داد. لذا پیشنهاد می‌شود از بین ژنتیپ‌های پلی‌کراس، ژنتیپ‌هایی که تراکم پایینی از جمعیت آفت را نشان دادند را انتخاب و برای تثبیت این صفات برنامه‌های اصلاحی روی آنها ادامه یابد.

اصلاح ژنتیپ‌های انتخابی پیاز مورد آزمایش در بیشتر ژنتیپ‌ها باعث بهبود خصوصیات زراعی گیاه (اطلاعات در این مقاله آورده نشده است) و کاهش حساسیت آن در برابر آسیب توسط تریپس گردید. به عبارت دیگر جذایت به تریپس و آسیب

سپاسگزاری

بدین وسیله نویسندهای از آقای مهندس محمد خیراندیش برای

منابع مورد استفاده

۱. باقری، س. ۱۳۷۹. مقایسه حساسیت سه رقم پیاز نسبت به تریپس پیاز *Thrips tabaci* در دزفول. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، اصفهان.
۲. حسن‌زاده سلماسی، م. ۱۳۷۳. بال ریشک‌داران، زیست شناسی و اهمیت آنها در کشاورزی (برگردان). انتشارات دانشگاه تبریز.
۳. خانجانی، م. ۱۳۸۴. آفات سبزی و صیفی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
۴. دهداری، ا. ۱۳۷۸. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، اگرونومیکی و سیتوژنتیکی و مطالعه همبستگی آنها در پیازهای بومی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۵. دهداری، ا. ع. رضایی و م. مبلی. ۱۳۸۰. ارزیابی ویژگی‌های ظاهری، زراعی و گروه‌بندی برخی از ژنوتیپ‌های پیاز بومی ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۵(۲): ۱۰۹-۱۲۴.
۶. دهداری، ا. م. مبلی و ع. رضایی. ۱۳۸۰. روابط صفات و تجزیه ضرایب مسیر برای عملکرد غده و بذر در برخی از پیازهای بومی ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ۵(۴): ۵۳-۶۹.
۷. صدر آبادی حقیقی، ر. مرعشی، ح. و نصیری محلاتی، م. ۱۳۷۵. اصول اصلاح گیاهان زراعی (برگردان). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
۸. کلافچی، م.، م. مبلی، ر. عبادی و ع. رضایی. ۱۳۸۴. بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (*Thrips tabaci*) و تأثیر آن روی نسبت غده دهی ارقام انتخابی پیاز در اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران ۳۶(۶): ۱۴۶۵-۱۴۷۷.
۹. کلافچی، م. ۱۳۸۱. نوسانات جمعیت و میزان آسیب وارد تریپس پیاز *Thrips tabaci* روی برخی از ارقام انتخابی پیاز در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
۱۰. مبلی، م.، ا. دهداری، ع. رضایی و ا. مرتضوی بیگ. ۱۳۸۱. بررسی تولید بذر و تأثیر اندازه سوخت مادری بر رویزگی‌های زایشی در برخی از پیازهای بومی ایران. مجله علوم و فنون باگبانی ایران ۳(۴ و ۳): ۱-۱۲.
۱۱. مرتضوی بیک، ا. و م. باقری. ۱۳۷۸. طرح مقایسه میزان تحمل یا حساسیت ارقام پیازهای موردکشت و کار در ایران به تریپس پیاز (*Thrips tabaci*) به منظور جستجوی منابع مقاومت. گزارش پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان.
۱۲. نوری مقدم، ر.، ج. حبیبی، م. آفتتابی، ش. اکبری نوشاد، ا. مرتضوی بیک و م. باقری. ۱۳۷۹. جستجوی تحمل یا مقاومت نسبی ارقام تجاری پیاز به تریپس پیاز (*Thrips tabaci*). خلاصه مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، بابلسر.
۱۳. همتی، ف. و پ. بنديكتوس. ۱۳۷۹. بررسی مقاومت توده‌های پیاز بانک ژن گیاهی ملی ایران به تریپس پیاز *Thrips tabaci* در دزفول. خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، اصفهان.
۱۴. یوسفی، م. و ا. عباسی فر. ۱۳۸۵. ارزیابی تحمل به تریپس (*Thrips tabaci*, Lind.) در ژنوتیپ پیاز اصلاح شده سفید خمین در مقایسه با ارقام پیاز رایج در کشور. خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، کرج.
15. Bocak, L. 1995. Comparison of onion cultivars in respect of infestation with onion thrips (*Thrips tabaci*, Lind.). *Zahradnictvi* 22(1): 11-14.
16. Childers, C. C. 1997. Feeding and Oviposition Injuries to Plants, PP. 505-539. In: Lewis, T. (Ed.), *Thrips as Crop*

- Pests. First ed., CAB International, New York.
17. Coudriet, D. L., A. N. Kisaba , J. D. McCreight and G. W. Bohn. 1979. Varietal resistance in onion to thrips. *J. Econ. Entomol* 72: 614-615.
18. Edelson, J. V., J. J. Magaro and T. A. Royer. 1991. Onion cultivar yield response to onion thrips infestations. *Prog. Rep. Texas Agric. Exper. Stat. PR-4815*: 3pp.
19. Kendall, D. M. and J. L. Capniera. 1987. Susceptibility of onion growth stages to onion thrips (Thysanoptera: Thripidae) damage and mechanical defoliation. *Environ. Entomol.* 16: 850-863.
20. Kogel, W. J. de and E. H. Koschier. 2001. *Thrips* responses to plant odours. *Thrips and Tospoviruses: Proceedings of the 7th International Symposium on Thysanoptera*. Reggio Calabria, Italy.
21. Lall, B. S. and L. M. Singh. 1968. Biology and control of the onion thrips in India. *J. Econ. Entomol.* 61(3): 676-679.
22. Ludger, J. S. and J. R. Victor. 2005. Integrated management of onion thrips (*Thrips tabaci*) in onion (*Allium cepa* L.). *Proc. Fla. State Hort. Soc.* 118: 125-126.
23. Mayer, D. F., J. D. Lunden and L. Rathbone. 1987. Evaluation of insecticides for *Thrips tabaci* (Thysanoptera: Thripidae) and effects of thrips on bulb onions. *J. Econ. Entomol.* 80: 930-932.
24. Shelton, W., W. T. Wilsey and M. A. Schmaedick. 1998. Management of onion thrips (Thysanoptera: Thripidae) on cabbage by using plant resistance and insecticides. *J. Econ. Entomol.* 91(3): 329-333.
25. Venkatesh, D. and P. M. M. David. 2003. Efficacy of fish oil rosin soap, neem oil and insecticides against onion thrips *Thrips tabaci* Lindeman. *Madras Agric. J.* 90 (7-9): 562-564.