

شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین استرین‌های *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان با استرین‌های برخی دیگر از گونه‌های *Xanthomonas*

غلام خداکرمان^{۱*} و ژان سوینگز^۲

(تاریخ دریافت: ۸۶/۶/۲۴؛ تاریخ پذیرش: ۸۶/۱۱/۳۰)

چکیده

الگوی پروتئین الکتروفورز شده ۲۱ استرین *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* جدا شده از مرکبات دو استان هرمزگان و کرمان به همراه استرین‌های استاندارد نماینده *X. a. pv. citri* و *X. a. pv. aurantifoli* توسط نرم افزار Gel Compar version 4.2 با ۲۴۶ استرین از گونه‌های: *X. a. pv. citri*, *X. a. pv. glycins*, *X. a. pv. manihotis*, *X. campestris* pv. *campestris*, *X. a. pv. phaseoli*, *X. cassavae*, *X. vesicatoria*, *X. c. pv. euphorbia*, *X. c. pv. arracaciae*, *X. a. pv. malvacearum*, *X. a. pv. clitoriae*, *X. a. pv. citrumelo*, *X. a. pv. aurantifoli*, *X. a. pv. alfalvae*, *X. cucurbitae*, *X. a. pv. dieffenbachiae*, *X. vasicola* pv. *holcicola*, *X. melonis*, *X. hortorum* pv. *pelargonii*, *X. a. pv. poinsetticola*, *X. arboricola* pv. *pruni*, *X. c. pv. raphani*, *X. a. pv. ricini*, *X. a. pv. vasculorum*, *X. a. pv. X. c. pv. barbareae* و *X. c. vignicola*, *X. c. pv. armoraciae*, استرین‌های مورد بررسی به طور متوسط بیش از ۸۶٪ بود. استرین‌های جدا شده از استان‌های هرمزگان و کرمان دارای بیشترین شباهت (۱۰۰٪) به استرین‌های *X. a. pv. citri* LMG 9176 و *X. a. pv. citri* LMG 9654 و کمترین شباهت (۸۴/۹۰٪) به استرین‌های *X. c. pv. euphorbia* LMG 7402 و *X. a. pv. ricini* LMG 7444 بودند. شباهت کامل الگوی پروتئین الکتروفورز شده استرین‌های جدا شده از استان‌های هرمزگان و کرمان به برخی استرین‌های پاتوتیپ A یا *X. a. pv. citri* با الگوی بیماری‌زایی آن که در مطالعات پیشین ما تعیین شده بود، مطابقت دارد.

واژه‌های کلیدی: شانکر باکتریایی مرکبات، کرمان، هرمزگان، *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri*، *Xanthomonas*

مقدمه

یابیوتیپ می‌باشد (۹). هنگامی که پروتئین‌های محلول سلولی باکتری‌ها در ژل پلی‌آکریل‌آمیدالکتروفورز می‌شوند، استرین‌های وابسته به یک گونه، الگوی مشابه داشته ولی الزاماً یکسان (Identical) نبوده و ممکن است برخی از نوارهای پروتئینی پررنگ‌تر از بقیه باشند. در این حالت الگوی عمومی نوارهای

پروتئین‌ها یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای تعیین ویژگی‌ها، شناسایی و رده‌بندی میکروارگانیسم‌ها بوده و الکتروفورز پروتئین روش حساسی است که معمولاً قادر به تفکیک شباهت‌ها و تفاوت‌ها در بین استرین‌های یک گونه، زیر گونه

۱. استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

۲. استاد باکتری‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنت، بلژیک

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Khodakaramian@yahoo.com

که گروه یک شامل استرین‌های تیپ A، گروه دو استرین‌های تیپ B، D و برخی استرین‌های تیپ A، گروه سه شامل استرین‌های تیپ C و گروه چهار شامل استرین‌های تیپ E بودند. نتایج این تحقیق نیز گویای حساسیت این روش می‌باشد که با نتایج از DNA:DNA hybridization مطابقت داشته است. در هیچ‌یک از تحقیقات انجام شده در ایران، استرین‌های *X. axonopodis* عامل بیماری شانکر مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان که ابتدا توسط عزیزاده و رحیمیان (۳) گزارش گردید و بعد به وسیله مستوفی زاده (۴) برخی ویژگی‌های آنها بررسی شد، استفاده از الکتروفورز پروتئین برای گروه‌بندی استرین‌های این باکتری به کار گرفته نشده است. هدف این تحقیق بررسی هم‌گونی و یا ناهم‌گونی استرین‌های باکتری عامل شانکر مرکبات جنوب ایران و تعیین میزان شباهت آنها به استرین‌های سایر گونه‌های *Xanthomonas* است تا نشان داده شود که بررسی الگوی الکتروفورز پروتئین به تنهایی برای تفکیک و شناسایی پاتوارها و حتی گونه‌های یک جنس کافی نیست و باید از روش‌های دیگرمانند بررسی بیماری‌زایی نیز کمک گرفت. از نظر شباهت الگوی پروتئینی، برخی از گونه‌های *Xanthomonas* دارای درجه شباهت مشابه و حتی بیشتر از استرین‌های درون یک گونه به همدیگر می‌باشند و لذا مقایسه الگوی پروتئین به تنهایی برای شناسایی و تفکیک گونه‌های مختلف یک جنس کافی نبوده و قابل اعتماد نمی‌باشد. استرین‌های عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات قبلاً از نظر ویژگی‌های بیماری‌زایی، دامنه میزبانی، الگوی پروتئین و فنوتیپی به وسیله خداکرمان و همکاران (۲۰۱) بررسی شده‌اند و در این بررسی با سایرگونه‌های *Xanthomons* مقایسه شدند.

مواد و روش‌ها

استرین‌های مورد استفاده در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

الکتروفورز پروتئین‌های سلولی و تجزیه آنها با نرم افزار

Gel Compar

استرین‌های نماینده گونه‌های مختلف *Xanthomonas* و پنج

پروتئینی مشابه بوده و ممکن است نوارهای خاصی با هم متفاوت باشند. بررسی‌های پژوهشگران مختلف نشان داده که همیشه رابطه‌ای بین میزان شباهت الگوی الکتروفورز شده پروتئین و DNA:DNA hybridization وجود دارد از جمله کاتو و همکاران (۶) مشاهده کردند که استرین‌های با بیش از ۸۰٪ شباهت در DNA الگوی الکتروفورزی پروتئین مشابه دارند ولی استرین‌های با ۷۰٪ شباهت در DNA، تفاوت‌های جزئی داشته و چنانچه شباهت DNA کمتر از ۷۰٪ باشد تفاوت‌های قابل توجهی در الگوی الکتروفورز شده پروتئین دیده می‌شود. اهمیت روش الکتروفورز پروتئین در رده‌بندی استرین‌های جنس *Xanthomonas* ابتدا به وسیله ال‌شرکاو و هیوزینق (۵) گزارش گردید و بعد توسط واترین و همکاران به صورت وسیع در گروه‌بندی استرین‌های جنس *Xanthomonas* از منابع مختلف استفاده شد (۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴). پس از آن این روش رایانه‌ای شد و هر بار استرین‌های زیادی از باکتری‌های مختلف مورد تجزیه قرار گرفتند، از جمله سن‌توس و دیانز (۷) تفاوت‌های *X. a. pv. manihotis* و *X. c. pv. casala* را با روش الکتروفورز پروتئین نشان دادند و واترین و همکاران (۱۰) با مقایسه ۱۵۵ استرین *X. c. pv. Begoniae*، *X. c. pv. horticola* و *X. c. pv. pelargonii* جمع‌آوری شده از نقاط مختلف جهان، نتیجه گرفتند که این دو پاتوار شبیه بوده ولی از *X. c. pv. campestris* قابل تفکیک هستند. در یک بررسی گسترده با روش الکتروفورز پروتئین، ۳۰۷ استرین از گونه‌های جنس *Xanthomonas* و ۲۷ پاتوار از *X. campestris* به وسیله واترین و همکاران (۱۲) در ۱۹ دسته، گروه‌بندی شدند.

استرین‌های *X. axonopodis* عامل شانکر و لکه برگی مرکبات از نظر ویژگی‌های بیماری‌زایی در سه پاتوار و پنج پاتوتیپ قرار می‌گیرند که این پاتوارها و تیپ‌ها شامل *X. a. pv. citri* یا تیپ A، *X. a. pv. aurantifolii* یا تیپ‌های B، C و D و *X. a. pv. citrumelo* یا تیپ E هستند. واترین و همکاران (۱۱) استرین‌های نماینده پاتوتیپ‌های عامل بیماری شانکر و لکه برگی مرکبات را با روش الکتروفورز پروتئین به چهار گروه تفکیک کردند

جدول ۱. استرین‌های بررسی شده *Xanthomonas axonopodis* عامل بیماری‌های شانکر و لکه برگ‌ی باکتریایی مرکبات

| نام پاتووار | شماره استرین | محل جدا سازی |
|---|--|--------------|
| <i>X.a. pv. citri</i> | LMG - 680, 9654, 9659 | نیوزلند |
| <i>X.a.pv.aurantifolii</i> | LMG - 9181, 9183 | آرژانتین |
| <i>X.a. pv. citrumelo</i> | LMG- 9163 | آمریکا |
| <i>X.a. pv. citri</i> <i>X.a. pv. citri</i> <i>X.a. pv. citri</i> | R- 4818, 4867, 4869, 4891, 4894, 4904, 4906, 4907, 4917, 4929, 5226, 5235, 5239, 422, 5423, 5424, 5427, 5439, 5440, 5242, 5443, 5242 | ایران |

*: LMG و R به ترتیب کلکسیون دائمی و موقت آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه GENT کشور بلژیک

جدول ۲. استرین‌های برخی گونه‌های *Xanthomonas* مقایسه شده با استرین‌های *X. axonopodis* pv. *citri* جدا شده از مرکبات استان‌های

هرمزگان و کرمان

| شماره استرین | نام استرین باکتری |
|--|------------------------------------|
| LMG - 8080 | <i>X. a. pv. alfalfae</i> |
| LMG - 7383 | <i>X. c. pv. armoraciae</i> |
| LMG - 8240, 8242 | <i>X. c. pv. arracaciae</i> |
| LMG - 7385, 547 | <i>X. c. pv. barbareae</i> |
| LMG - 568, 575, 947, 8095, 7514 | <i>X. c. pv. campestris</i> |
| LMG - 8048, 8237 | <i>X. cassavae</i> |
| LMG - 680, 681, 682, 683, 8650, 8653, 8654, 8657, 9176, 9178, 9652, 9653, 9655, 9656, 9657, 9654, 9659, 9660, 9662, 9663, 9664, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670, 9671, 9672 | <i>X. a. pv. citri</i> |
| LMG - 9182, 9185 | <i>X. a. pv. aurantifolii</i> |
| LMG - 9168, 9321 | <i>X. a. pv. citrumelo</i> |
| LMG - 9045 | <i>X. a. pv. clitoriae</i> |
| LMG - 7479, 8689 | <i>X. cucurbitae</i> |
| LMG - 695, 8664 | <i>X.a..pv. dieffenbachiae</i> |
| LMG - 863, 7402 | <i>X. c. pv. euphorbiae</i> |
| LMG - 712, 7488, 8023, 8125, 8128 | <i>X. a. pv. glycins</i> |
| LMG - 736 | <i>X. vasicola. pv. holcicola</i> |
| LMG - 760, 763, 764, 7426, 7427, 7428, 7429, 9572, 11169 | <i>X.a. pv. malvacearum</i> |
| LMG - 766, 769, 771, 777, 779, 780, 784 | <i>X. a. pv. manihotis</i> |
| LMG - 8673 | <i>X. melonis</i> |
| LMG - 7312, 7314 | <i>X. hortorum. pv. pelargonii</i> |
| LMG - 823, 834, 8014 | <i>X. a. pv. phaseoli</i> |
| LMG - 849, 8677, 8678 | <i>X. a. pv. poinsettiicola</i> |
| LMG - 851 | <i>X. arboricola pv. pruni</i> |
| LMG - 7505, 8010 | <i>X. c. pv. raphani</i> |
| LMG - 864, 7442, 7444, 8683 | <i>X. a. pv. ricini</i> |
| LMG - 902 | <i>X. a. pv. vasculorum</i> |
| LMG - 667, 668, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 913, 914, 922, 7514 | <i>X. vesicatoria</i> |
| LMG - 839, 8138 | <i>X. a. pv. vignicola</i> |

*: LMG کلکسیون دائمی آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه GENT کشور بلژیک

میزبانی آنها توسط خداکرمان و همکاران بررسی گردیده بود (استرین‌های ذکر شده جدول ۱) مورد استفاده قرار گرفت (۱ و ۲).
یاخته‌های باکتری در تشتک‌های حاوی محیط

پاتوتیپ شناخته شده باکتری عامل بیماری‌های شانکر و لکه برگ‌ی مرکبات به همراه استرین‌هایی که پیش از این بررسی از مرکبات جنوب ایران جداسازی و ویژگی‌های فنوتیپی، بیماری‌زایی و دامنه

پیشین (۱ و ۲) مطابقت کامل دارد. کمترین میزان شباهت ۸۳/۹٪ بود که بین استرین‌های *X. axonopodis* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان و استرین‌های *X. c. pv. euphorbia* LMG 7402 و *X. a. pv. ricini* LMG 7444 وجود داشت. میانگین شباهت استرین‌های جدا شده از دو استان مزبور با استرین‌های نماینده *X. a. pv. aurantifolii* ۸۶/۵۳٪ و بیشترین شباهت بین استرین‌های فوق و این پاتووار ۸۶/۷٪ برای *X. a. pv. aurantifolii* LMG 9185 بوده است. این میزان از شباهت نیز با سایر داده‌های بررسی‌های قبلی از جمله ویژگی‌های فنوتیپی و دامنه میزبانی مطابقت داشته و گویای تفاوت قابل توجه این استرین‌ها به ویژه از دید بیماری‌شناسی گیاهی می‌باشد. استرین‌های *X. axonopodis* عامل بیماری‌های شانکر و لکه برگ‌ی مرکبات از نظر ویژگی‌های بیماری‌زایی در سه پاتووار *X. a. pv. citri*، *X. a. pv. aurantifolii*، یا تیپ‌های B، C و D و *X. a. pv. citrumelo* یا تیپ E قرار می‌گیرند. واترین و همکاران (۱۱ و ۱۴) استرین‌های نماینده پاتوتیپ‌های عامل بیماری شانکر و لکه برگ‌ی مرکبات را با روش الکتروفورز پروتئین به چهار گروه تفکیک کرده‌اند که گروه یک شامل استرین‌های تیپ A، گروه دو استرین‌های تیپ B، D و برخی استرین‌های تیپ A، گروه سه استرین‌های تیپ C و گروه چهار استرین‌های تیپ E بودند. نتایج تحقیق واترین و همکاران (۱۱) گویای حساسیت روش الکتروفورز پروتئین می‌باشد که با نتایج DNA:DNA hybridization مطابقت داشته است. در تحقیق دیگری توسط واترین و همکاران (۱۳) تعداد ۱۴۴ استرین نماینده گونه‌ها و پاتوارهای *Xanthomonas* بیماری‌زا روی غلات و گراس‌های وحشی با سه روش الکتروفورز پروتئین، آنالیز اسیدهای چرب و DNA:DNA hybridization مقایسه گردیده‌اند. نتایج این بررسی نشان داده که روش الکتروفورز پروتئین در مقایسه با روش آنالیز اسیدهای چرب، با توجه به تفکیک این گونه‌ها و پاتوارها بر اساس الگوی بیماری‌زایی از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار بوده و توانسته است که پاتوارهای مشابه از نظر الگوی بیماری‌زایی

کشت GYCA (Glucose Yeast Chalk Agar) که شامل: ۱٪ گلوکز، ۵/۰٪ شیرۀ مخمر، ۳٪ کرینات کلسیم و ۲٪ آگار بود، کشت شدند. تست‌ها به مدت یک تا دو روز، در دمای ۲۰°C نگره‌داری شدند. استخراج پروتئین، الکتروفورز در ژل پلی‌آکریل‌امید (SDS-PAGE)، رنگ‌آمیزی، رنگ‌بری، خشک و اسکن کردن ژل‌ها و پردازش داده‌های به دست آمده با روش واترین و همکاران (۱۲) انجام شد.

نرمال کردن داده‌ها (DATA normalization) و تجزیه داده‌ها (DATA analysis) با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای Gel Compar version 4.2 انجام شد. داده‌های به دست آمده با بانک داده‌های (DATA base) ایجاد شده به وسیله واترین و همکاران (۱۲) مقایسه شد و با استفاده از نرم‌افزار یاد شده درصد شباهت هریک از استرین‌ها با سایر استرین‌های مورد بررسی محاسبه گردید.

نتایج و بحث

نتایج مقایسه الگوی الکتروفورز پروتئین‌های محلول سلولی استرین‌های مورد بررسی به تفکیک در جدول ۳ و میانگین شباهت هر استرین به استرین‌های سایر گونه‌های *Xanthomonas* در جدول ۴ نوشته شده است.

همان طوری که در جداول ۳ و ۴ دیده می‌شود میانگین شباهت الگوی الکتروفورز پروتئین بین استرین‌های *Xanthomonas axonopodis* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان و استرین‌های مورد بررسی از سایر گونه‌های *Xanthomonas* بیش از ۸۶٪ می‌باشد. محاسبه میانگین شباهت‌ها برای استرین‌های *X. axonopodis* جدا شده از مرکبات دو استان مزبور نشان می‌دهد که این استرین‌ها بیشترین شباهت را با استرین‌های *X. a. pv. citri* یا پاتوتیپ A دارند. استرین‌های مزبور با برخی استرین‌های استاندارد تیپ A از جمله *X. a. pv. citri* LMG 9176 و *X. a. pv. citri* LMG 9654 ۱۰۰٪ شباهت داشتند. این نتایج با داده‌های به دست آمده از بررسی دامنه میزبانی و الگوی بیماری‌زایی در بررسی‌های

جدول ۳. میزان شباهت الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های محلول سلولی استرین‌های *X. a. pv. citri* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان با استرین‌های برخی از گونه‌های *Xanthomonas*

| نام باکتری | میزان شباهت (%) | نام باکتری | میزان شباهت (%) |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <i>X. a. pv. citri</i> R- 4867 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 4869 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9 176 | 100.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 8657 | 87.00 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9662 | 90.80 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9663 | 90.60 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 99669 | 89.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9660 | 90.50 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 8657 | 87.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9672 | 90.50 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 682 | 87.70 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9653 | 90.20 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 680 | 86.50 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9659 | 89.80 |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 681 | 86.40 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9666 | 88.30 |
| <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9182 | 86.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9657 | 88.20 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 907 | 90.20 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 8650 | 87.10 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 908 | 88.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9668 | 86.90 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 922 | 86.40 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9652 | 86.70 |
| <i>X. c. euphorbiae</i> LMG 863 | 87.10 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 8654 | 86.20 |
| <i>X. c. arracaciae</i> LMG 8242 | 86.00 | | |
| <i>X. c. pv. citri</i> R-5242 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 4891 | |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 80.20 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9654 | 100.00 |
| <i>X. c. pv. citri</i> R- 5427 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 5239 | |
| <i>X. a. pv.citri</i> LMG 683 | 87.90 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 681 | 86.80 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 764 | 86.20 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 680 | 86.60 |
| | | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9671 | 86.40 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R- 5424 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 4929 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 680 | 86.70 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 680 | 88.40 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9178 | 86.30 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 681 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 683 | 86.10 | <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9182 | 86.40 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 764 | 87.90 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 87.10 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 87.40 | <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 7488 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. clitoriae</i> LMG 9045 | 87.70 | <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 766 | 86.10 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R- 5422 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 4906 | |
| <i>X. a. pv. citrumelo</i> LMG 9168 | 85.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9176 | 100.00 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 85.60 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9662 | 88.20 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 764 | 85.20 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 9669 | 87.10 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 947 | 85.00 | <i>X. a. pv.citri</i> LMG 682 | 86.60 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 85.40 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 907 | 88.30 |
| | | <i>X. vesicatoria</i> LMG 922 | 87.10 |
| | | <i>X. a. pv. vasculorum</i> LMG 902 | 86.40 |

ادامه جدول ۳

| <i>X. a. pv. citri</i> R- 4904 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 5440 | |
|---|--------|---|-------|
| <i>X. a. pv. citrumelo</i> LMG 9168 | 89.60 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9178 | 86.30 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 683 | 87.20 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 88.50 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 764 | 90.70 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7429 | 87.50 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 89.60 | <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 7488 | 86.50 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 9572 | 86.70 | <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 8128 | 89.00 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 8128 | 86.30 | <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 779 | 86.50 |
| <i>X. c. pv. raphani</i> LMG 8010 | 88.20 | <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 569 | 86.90 |
| <i>X. a. pv. clitoriae</i> LMG 9045 | 87.30 | | |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 904 | 86.70 | | |
| <i>X. a. pv. poinsetticola</i> LMG 849 | 86.40 | | |
| <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9181 | | <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9654 | |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 90.90 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 87.30 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 8023 | 87.00 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9662 | 86.20 |
| <i>X. a. pv. phaseoli</i> LMG 834 | 86.10 | <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 86.00 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R-5421 | | <i>X. a. pv. citri</i> R-5226 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9178 | 86.10 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9655 | 86.60 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R-4917 | | <i>X. a. pv. citri</i> R- 5443 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9176 | 100.00 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9178 | 86.10 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R-4818 | | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9659 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9662 | 90.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9666 | 89.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 682 | 87.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9670 | 89.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 86.90 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9664 | 89.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8650 | 86.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 682 | 89.50 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9672 | 85.80 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9653 | 89.10 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9669 | 85.50 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8650 | 88.90 |
| <i>X. c. pv. euphorbiae</i> LMG 863 | 89.90 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9660 | 88.30 |
| <i>X. c. pv. euphorbiae</i> LMG 7402 | 84.90 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 88.20 |
| <i>X. vesicatoriae</i> LMG 922 | 88.00 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9652 | 88.10 |
| <i>X. vesicatoriae</i> LMG 907 | 89.00 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9654 | 87.80 |
| <i>X. vesicatoriae</i> LMG 7514 | 86.60 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8650 | 87.70 |
| <i>X. vesicatoriae</i> LMG 908 | 86.50 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9657 | 87.60 |
| <i>X. vesicatoriae</i> LMG 905 | 85.10 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9659 | 87.40 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 87.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9663 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 8125 | 85.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 680 | 87.00 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 86.90 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8652 | 86.90 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 7514 | 86.60 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9667 | 86.70 |
| <i>X. cassavae</i> LMG 8237 | 86.80 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9656 | 86.50 |
| <i>X. c. pv. arracaciae</i> LMG 8242 | 86.70 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 681 | 86.30 |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 769 | 86.20 | <i>X. a. pv. citrumelo</i> LMG 9321 | 89.20 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7427 | 86.10 | <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568.A | 88.40 |
| <i>X. c. pv. barbareae</i> LMG 547 | 86.10 | <i>X. c. pv. barbareae</i> LMG 7385 | 87.10 |
| <i>X. a. pv. poinsetticola</i> LMG 8677 | 85.90 | | |
| <i>X. cucurbitae</i> LMG 7479 | 85.50 | | |
| <i>X. a. pv. vignicola</i> LMG 8138 | 85.20 | | |
| <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> LMG 695 | 85.10 | | |
| <i>X. a. pv. ricini</i> LMG 7444 | 84.90 | | |

ادامه جدول ۳.

| <i>X. a. pv. citri</i> R-5235 | | <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9658 | |
|---|--------|---|-------|
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9176 | 100.00 | <i>X. c. pv. glycines</i> LMG 712 | 87.50 |
| | | <i>X. c. pv. citri</i> LMG 8657 | 86.57 |
| <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> LMG 8664 | | <i>X. a. pv. citri</i> R-5426 | |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 777 | 88.20 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9662 | 90.60 |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 771 | 86.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9669 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 780 | 86.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 86.90 |
| <i>X. vasicola</i> pv. <i>holcicola</i> LMG 736 | 88.10 | <i>X. c. pv. aurantifolii</i> LMG 9182 | 86.50 |
| <i>X. a. pv. ricini</i> LMG 7442 | 87.80 | <i>X. cucurbitae</i> LMG 7479 | 88.40 |
| <i>X. a. pv. ricini</i> LMG 864 | 87.40 | <i>X. c. pv. vignicola</i> LMG 839 | 87.60 |
| <i>X. a. pv. ricini</i> LMG 8683 | 86.70 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7428 | 87.30 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 87.80 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 910 | 87.00 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 8005 | 86.50 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 907 | 86.70 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 575 | 86.50 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 667 | 86.60 |
| <i>X. cucurbitae</i> LMG 8689 | 87.20 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 905 | 86.10 |
| <i>X. arboricola</i> pv. <i>pruni</i> LMG 851 | 87.10 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 906 | 86.40 |
| <i>X. c. pv. armoraciae</i> LMG 7383 | 87.00 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 922 | 86.30 |
| <i>X. c. pv. arracaciae</i> LMG 8240 | 87.00 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 914 | 88.30 |
| <i>X. hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> LMG 7314 | 86.50 | <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> LMG 695 | 87.40 |
| <i>X. hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i> LMG 7312 | 86.40 | <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 86.70 |
| <i>X. melonis</i> LMG 8673 | 86.40 | <i>X. c. pv. euphorbiae</i> LMG 863 | 86.80 |
| <i>X. c. pv. raphani</i> LMG 7505 | 86.40 | <i>X. a. pv. phaseoli</i> LMG 823 | 86.60 |
| | | <i>X. a. pv. poinsetticola</i> LMG 8678 | 86.40 |
| | | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 11169 | 87.20 |
| | | <i>X. c. a. pv. alfalfa</i> LMG 8080 | 86.00 |
| <i>X. a. pv. citri</i> R-4894 | | <i>X. a. pv. citri</i> R-5423 | |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9176 | 87.20 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9662 | 90.60 |
| <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9185 | 86.70 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9669 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. citrumelo</i> LMG 9168 | 86.60 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 86.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 683 | 86.50 | <i>X. c. pv. aurantifolii</i> LMG 9182 | 86.50 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 682 | 86.30 | <i>X. cucurbitae</i> LMG 7479 | 88.40 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7428 | 90.90 | <i>X. c. pv. vignicola</i> LMG 839 | 87.60 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7429 | 90.00 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7428 | 87.30 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 760 | 88.80 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 910 | 87.00 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 7426 | 87.90 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 907 | 86.70 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 764 | 87.70 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 667 | 86.60 |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 763 | 86.90 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 905 | 86.10 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 908 | 90.10 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 906 | 86.40 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 922 | 88.60 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 922 | 86.30 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 668 | 88.30 | <i>X. vesicatoria</i> LMG 914 | 88.30 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 914 | 87.40 | <i>X. c. pv. dieffenbachiae</i> LMG 695 | 87.40 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 905 | 87.30 | <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 86.70 |
| <i>X. vesicatoria</i> LMG 913 | 86.70 | <i>X. c. pv. euphorbiae</i> LMG 863 | 86.80 |
| <i>X. c. pv. barbareae</i> LMG 547 | 89.60 | <i>X. a. pv. phaseoli</i> LMG 823 | 86.60 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 89.30 | <i>X. c. pv. poinsetticola</i> LMG 8678 | 86.40 |
| <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> LMG 695 | 88.20 | <i>X. a. pv. malvacearum</i> LMG 11169 | 87.20 |
| <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> LMG 695 | 87.30 | <i>X. a. pv. alfalfa</i> LMG 8080 | 86.00 |

ادامه جدول ۳.

| <i>X. a. pv. aurantifolii</i> LMG 9183 | | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 682 | |
|--|-------|-------------------------------------|-------|
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9669 | 87.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9660 | 90.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9662 | 87.70 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9666 | 90.20 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9672 | 87.30 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9663 | 90.20 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9657 | 86.80 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9672 | 89.10 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9660 | 86.60 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9659 | 88.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 682 | 86.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9667 | 87.90 |
| <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8657 | 86.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9321 | 89.60 |
| <i>X. a. pv. glycins</i> LMG 712 | 88.20 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9668 | 87.10 |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 784 | 88.20 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9652 | 86.90 |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> LMG 769 | 86.40 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9653 | 90.20 |
| <i>X. a. pv. phaseoli</i> LMG 8014 | 87.80 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9664 | 89.90 |
| <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 87.70 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9670 | 86.90 |
| <i>X. cassavae</i> LMG 8048 | 86.20 | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9656 | 86.70 |
| | | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 9657 | 86.50 |
| | | <i>X. a. pv. citri</i> LMG 8654 | 86.20 |
| | | <i>X. c. pv. campestris</i> LMG 568 | 86.60 |

جدول ۴. میانگین شباهت الگوی پروتئین استرین‌های بررسی شده *Xanthomonas axonopodis* عامل بیماری شانکر مرکبات با برخی

استرین‌های سایرگونه‌های *Xanthomonas*

| <i>Xanthomonas</i> spp. | <i>X. a. pv. Citri</i> | <i>X. a. pv. Aurantifolii</i> |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <i>X. a. pv. citri</i> | 88.59 (86) | 86.79 (11) |
| <i>X. a. pv. glycins</i> | 87.19 (8) | 88.40 (4) |
| <i>X. a. pv. manihotis</i> | 86.62 (6) | 87.30 (2) |
| <i>X. c. pv. campestris</i> | 86.07 (11) | 86.85 (2) |
| <i>X. a. pv. phaseoli</i> | 86.60 (1) | 86.95 (2) |
| <i>X. cassavae</i> | 86.80 (1) | 86.20 (1) |
| <i>X. vesicatoria</i> | 87.30 (32) | -- |
| <i>X. c. pv. euphorbia</i> | 87.17 (4) | -- |
| <i>X. c. pv. arracaciae</i> | 86.57 (3) | -- |
| <i>X. a. pv. malvacearum</i> | 87.74 (22) | -- |
| <i>X. a. pv. clitoriae</i> | 87.03 (3) | -- |
| <i>X. a. pv. citrumelo</i> | 87.60 (4) | -- |
| <i>X. a. pv. aurantifolii</i> | 86.53 (3) | -- |
| <i>X. a. pv. alfalfae</i> | 86.20 (2) | -- |
| <i>X. cucurbitae</i> | 87.63 (4) | -- |
| <i>X. a. pv. dieffenbachiae</i> | 87.07 (6) | -- |
| <i>X. vasicola. pv. holcicola</i> | 88.10 (1) | -- |
| <i>X. melonis</i> | 86.40 (1) | -- |
| <i>X. hortorum. pv. pelargonii</i> | 86.45 (2) | -- |
| <i>X. a. pv. poinsetticola</i> | 86.40 (4) | -- |
| <i>X. arboricola pv. pruni</i> | 87.10 (1) | -- |
| <i>X. c. pv. raphani</i> | 87.30 (2) | -- |
| <i>X. a. pv. ricini</i> | 86.70 (4) | -- |
| <i>X. a. pv. vasculorum</i> | 86.40 (1) | -- |
| <i>X. a. pv. vignicola</i> | 87.05 (4) | -- |
| <i>X. c. pv. armoraciae</i> | 87.00 (1) | -- |
| <i>X. c. pv. barbareae</i> | 87.30 (30) | -- |
| | 87.10 (1) | -- |

*: اعداد داخل پرانتز تعداد استرین‌های بررسی شده را نشان می‌دهد.

-- بررسی نشده است.

پروتئینی هم‌اندازه دارای عملکرد یکسان در سلول زنده نمی‌باشند، در تعیین عملکرد و ایفای نقش یک پروتئین در

را تفکیک نماید. باتوجه به مبنای روش SDS-PAGE، نوارهای پروتئینی عمدتاً براساس اندازه تفکیک می‌شوند، الزاماً دو نوار

ویژه اگر استرین‌ها نماینده گروه‌های مختلف باشند، روش مناسبی است. به ویژه داده‌های جدول ۳ به خوبی نشان می‌دهد که شباهت الگوی پروتئینی برخی استرین‌های گونه‌های مشخص مانند *X. a. pv. X. vesicatoria* LMG 907 و *X. a. pv. glycins* LMG 712 *malvacearum* LMG 764 به استرین‌های پاتوارها *X. cucurbitae* LMG 7479 به استرین‌های پاتوارها *X. axonopodis* عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات جنوب ایران یکسان و یا حتی بیش از شباهت الگوی پروتئینی این استرین‌ها به همدیگر می‌باشد. این یافته به روشنی یکی از اهداف این بررسی را که در مقدمه به آن اشاره شده، را برآورده نموده و ضرورت به‌کارگیری سایر روش‌ها را برای تفکیک استرین‌های گونه‌های مختلف و استرین‌های وابسته به یک گونه گوشزد می‌کند. مقایسه بین گونه‌های مختلف یک جنس به روش SDS-PAGE توسط سایر محققین هم برای نشان دادن جنبه کاربردی این روش و هم اهمیت و کاستی‌های آن به کار گرفته شده است. از جمله در بررسی ۳۰۷ استرین‌گونه‌های جنس *Xanthomonas* و ۲۷ پاتوار از *X. campestris* به وسیله واترین و همکاران (۱۳) تعداد ۱۹ دسته از همدیگر قابل تفکیک بودند. این روش برای تفکیک استرین‌ها در حد پاتوار همیشه دقیق نمی‌باشد و برای تفکیک در این سطح تاکسونومیکی باید از روش‌های تکمیلی دیگر نیز کمک گرفته شود. نتایج این بررسی گویای شباهت بسیار بالای استرین‌های *X. axonopodis* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان به استرین‌های پاتوتیپ A بوده و الگوی بیماری‌زایی آنها را که در بررسی‌های پیشین تعیین شده بود (۱ و ۲) تأیید می‌نماید.

سلول زنده ساختمان اولیه یا ترتیب قرارگرفتن اسیدهای آمینه نقش تعیین کننده دارد. این واقعیت به روشنی از داده‌های این بررسی قابل استنتاج است چرا که مشاهده می‌شود پاتوارهای با الگوی بیماری‌زایی متفاوت، دارای شباهت نسبتاً یکسانی نسبت به یک استرین مشخص از یک پاتوار مشخص *X. axonopodis* می‌باشند. با توجه به این نقیصه در روش SDS-PAGE باید برای تشخیص دقیق به ویژه هنگامی که از نظر بیماری‌زایی اهمیت دارد، از سایر روش‌ها نیز به عنوان فاکتورهای تکمیلی کمک گرفت. علی‌رغم دقت و سرعت بالای روش SDS-PAGE در تفکیک و طبقه‌بندی موجودات و با توجه به نشان داده شدن الگوهای کلی در این روش، لازم است که به ویژه هنگامی که پروتئین‌های ویژه‌ای که محصول ژن یا ژن‌های به‌خصوصی هستند برای تفکیک دو یا چند ارگانسیم مهم هستند، از روش‌های تکمیلی کمک گرفته شود که توجه به این اصل در بیماری‌شناسی گیاهی بسیار مهم است.

میانگین شباهت استرین‌های *X. axonopodis* جدا شده از مرکبات استان‌های هرمزگان و کرمان با استرین‌های مورد بررسی سایر گونه‌های *Xanthomonas* با توجه به داده‌های جدول ۴ حدوداً بین ۸۶ تا ۸۷ درصد نوسان دارد. با توجه به داده‌های این جدول تفاوت چشم‌گیری از نظر درجه شباهت بین پاتوارهای مختلف وجود ندارد ولی چنانچه به داده‌های جدول ۳ و به ویژه به شباهت بالای برخی از استرین‌ها توجه نماییم آنگاه به تفاوت قابل توجه این استرین‌ها از نظر درجه شباهت پی خواهیم برد، در حالی که در نگاه کلی و محاسبه میانگین این شباهت‌ها، تفاوت‌های چشمگیر برخی از استرین‌ها روی سایر استرین‌های هم‌گروه خود سرشکن شده و خود را نشان نمی‌دهند. روش SDS-PAGE برای دسته‌بندی استرین‌ها به

منابع مورد استفاده

۱. خداکرمان، غ.، ح. رحیمیان، و. محمدی و ع. علامه. ۱۳۷۸. خصوصیات فنوتیپی، دامنه میزبانی و چگونگی پراکنش استرین‌های باکتری *Xanthomonas axonopodis* عامل شانکر مرکبات جنوب ایران. بیماری‌های گیاهی ۳۵ (۱، ۳): ۱۰۲-۱۱۱.
۲. خداکرمان، غ.، ژ. سوینگز، س. استوارت، س. ون‌ایزن و ح. رحیمیان. ۱۳۷۹. گروه‌بندی استرین‌های باکتری عامل ایجاد زخم و

لکه‌برگی مرکبات از آسیا، آمریکا و استرالیا بر اساس الگوی الکتروفورز پروتئین و سیستم بیولوگ. بیماری‌های گیاهی ۳۶ (۴، ۶): ۱۶۵-۱۷۸.

۳. علیزاده، ع. و ح. رحیمیان. ۱۳۶۹. شانکر باکتریایی مرکبات در استان کرمان. بیماری‌های گیاهی ۲۶: ۱۱۸.

۴. مستوفی‌زاده قلمفرسا، ر. ۱۳۷۵. بررسی استرین‌های عامل شانکر باکتریایی مرکبات در جنوب ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

5. El-Sharkavy, T. A. and D. Huisinigh. 1971. Electrophoretic analysis of estrases and other slouble proteins from representatives of phytopathogenic bacterial genera. J. Gen. Microbiol. 68: 149-154.
6. Cato, E. P., D. E. Hash, L. V. Holdman and W. E. C. Moor. 1982. Electrophretic study of *Clostridium* species. J. Clin. Microbiol. 15: 688-702.
7. dos Santos, R. M. D. B. and J. C. Dianese. 1985. Comparative membrane characterization of *Xanthomonas campestris* pv. *cassavae* and *X. campestris* pv. *manihotis*. Phytopathology 75: 581-7.
8. Kersters, K. and J. De Ley. 1980. Classification and identification of bacteria electrophoresis of thier preteins. In: Goodfellow, M. and Board, R. G. (Eds.), Microbiological Classification and Identification, Academic Press, London.
9. Vandamme, P., B. Pot, M. Gillis, P. De Vos, K. Kersters, and J. Swings. 1996. Polyphasic taxonomy a consensus approach to bacterial systematcis. Microbiol. Rev. 60: 407 - 438.
10. Vauterin, L., R. Vantomme, B. Pot, B. Hoste, J. Swings and K. Kersters. 1990. Taxonomic analysis of *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* and *X. c.* pv. *pelargoni* by means of phytopathological, phenotypic, protein electrophoretic and DNA hybridization methods. Syst. Appl. Microbiol. 13: 166-76.
11. Vauterin, L., P. Yang, B. Hoste, M. Vancannet, E. Civerolo, J. Swings and K. Kersters. K. 1991a. Differentiation of *Xanthomonas campestris* pv. *citri* strains by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis of proteins, fatty acid analysis and DNA-DNA hybridization. Int. J. Syst. Bacteriol. 41: 535 - 542.
12. Vauterin, L., Swings, J. and K. Kersters 1991b. Grouping of *Xanthomonas campestris* strains by SDS-PAGE of proteins. J. Gen. Microbiol. 137: 1677-1687.
13. Vauterin, L., P. Yang, B. Hoste, B. Pot, J. Swings and K. Kersters. 1992. Taxonomy of Xanthomonads from cereals and grasses based on SDS-PAGE of proteins, fatty acid analysis and DNA-DNA hybridization. J. Gen. Microbiol. 138: 1467-77.
14. Vauterin, L., B. Hoste, K. Kersters and J. Swings. 1995. Reclassification of *Xanthomonas*. Int. J. Syst. Bacteriol. 45: 472 - 489.